Burgerstein Micronutriments Compléments alimentaires et aliments d'appoint, Produits thérapeutiques

Compendium

Burgerstein Micronutriments

Compléments alimentaires et aliments d'appoint

Produits thérapeutiques

Burgerstein Vitamine

Burgerstein Micronutriments

Compléments alimentaires et aliments d'appoint

Produits thérapeutiques

Ce Compendium contient tous les produits Burgerstein.
Ces derniers sont classés en 3 groupes:

1. Compléments alimentaires et aliments d'appoint
2. Produits thérapeutiques
3. Produits thérapeutiques du canton d'Appenzell-Ausserrhoden

Vous disposez pour chaque groupe d'une table de matières avec une classification selon la catégorie des produits. Tous les produits sont mentionnés par ordre alphabétique à la page suivante.

© Copyright Antistress SA, Société pour la protection de la santé, CH-8640 Rapperswil-Jona

Table des matières

alphabétique

Aminovital	86
Anti-Ox	12
Anti-Ox/De-Tox	174
B-Komplex	14
Beta-Carotin 6 mg	142
Beta-Carotin 15 mg	144
C-Berry	36
Calcium D3-Toffees	48
ChondroVital	16
Chromvital	50
Coenzym Q_{10} capsules	114
Coenzym Q_{10} comprimés à sucer	116
Coenzym Q_{10} liquid	118
Creatin	88
Dolomit	52
Dolomit plus	54
Eisen plus	56
Energy	90
EPA-capsules 500 mg	164
EPO Nachtkerzenöl (Huile d'onagre EPO)	166
EyeVital	18
Geriatricum	134
Grossesse & Allaitement	20
hair&nails	22
Kalzium plus+	58
Kalziumvital	60
L-Arginin	92
L-Arginin L-Ornithin	94
L-Carnitin	96
L-Cystein	98
Lécithine	170
Lécithine granulés	120
L-Glutamin	100
L-Lysin	102
L-Methionin	104
Magnesiumorotat (Orotate de magnésium)	156
Magnesiumvital	62
Mélange de bases	64
Multimineral	66
Multivitamin	136
Multivitamin-Mineral ABC 25	176
Multivitamin-Mineral B75	178
Multivitamin-Mineral CELA	24
Omega-3 DHA	80
Omega-3 EPA	82
Phosphatidyl-Serin PS	122
Primärhefe (Levure nutritive)	124
Probase (comprimés)	70
Probase (poudre)	68
Protein	106
Protein plus	108
Selenvital	72
skin	26
Spirulina	126
Sport	28
sun	30
Taurin	110
TopVital	138
Vitamin A	146
Vitamin A/D	38
Vitamin B6 100 mg	148
Vitamin B-Komplex B50	180
Vitamin C 1000	184
Vitamin C-Komplex	40
Vitamin C retard	150
Vitamin D3	42
Vitamin D3 liquid	44
Vitamin E 100 I.E. / 400 I.E.	152
VitaMini	32
Zink-C	74
Zinkglukonat 8,5 mg / 30 mg	158
Zinktabletten 15 mg	160
Zinkvital	76

Compléments alimentaires et aliments d'appoint

Les compléments alimentaires et les aliments d'appoint de Burgerstein remplissent au maximum les critères de qualité exigés par Good Manufacturing Practice (GMP) et sont continuellement adaptés aux dispositions en vigueur de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

La composition et les constituants sont actualisés et optimisés en fonction des connaissances scientifiques les plus récentes des principes de base de la médecine orthomoléculaire. A cet effet, leur type et leur dosage sont harmonisés de façon à répondre de manière optimale aux besoins du corps et de fournir au consommateur les meilleurs avantages. Seuls les micronutriments qui se trouvent naturellement dans l'alimentation et dans l'organisme humain sont utilisés.

Les informations actuelles se trouvent sur l'étiquette du produit.

Table des matières

Compléments alimentaires et aliments d'appoint

Préparations combinées 11

Burgerstein Anti-Ox 12
Burgerstein B-Komplex 14
Burgerstein ChondroVital 16
Burgerstein EyeVital 18
Burgerstein Grossesse & Allaitement 20
Burgerstein hair&nails 22
Burgerstein Multivitamin-Mineral CELA 24
Burgerstein skin 26
Burgerstein Sport 28
Burgerstein sun 30
Burgerstein VitaMini 32

Vitamines 35

Burgerstein C-Berry 36
Burgerstein Vitamin A/D 38
Burgerstein Vitamin C-Komplex 40
Burgerstein Vitamin D_3 42
Burgerstein D_3 liquid 44

Sels minéraux/oligo-éléments 47

Burgerstein Calcium D3-Toffees 48
Burgerstein Chromvital 50
Burgerstein Dolomit 52
Burgerstein Dolomit plus 54
Burgerstein Eisen plus 56
Burgerstein Kalzium plus+ 58
Burgerstein Kalziumvital 60
Burgerstein Magnesiumvital 62
Burgerstein Mélange de bases 64
Burgerstein Multimineral 66
Burgerstein Probase (comprimés) 70
Burgerstein Probase (poudre) 68
Burgerstein Selenvital 72
Burgerstein Zink-C 74
Burgerstein Zinkvital 76

Acides gras 79

Burgerstein Omega-3 DHA 80
Burgerstein Omega-3 EPA 82

Acides aminés 85

Burgerstein Aminovital 86
Burgerstein Creatin 88
Burgerstein Energy 90
Burgerstein L-Arginin 92
Burgerstein L-Arginin L-Ornithin 94
Burgerstein L-Carnitin 96
Burgerstein L-Cystein 98
Burgerstein L-Glutamin 100
Burgerstein L-Lysin 102
Burgerstein L-Methionin 104
Burgerstein Protein 106
Burgerstein Protein plus 108
Burgerstein Taurin 110

Nutriments divers 113

Burgerstein Coenzym Q_{10} capsules 114
Burgerstein Coenzym Q_{10} comprimés à sucer 116
Burgerstein Coenzym Q_{10} liquid 118
Burgerstein Lécithine granulés 120
Burgerstein Phosphatidyl-Serin PS 122
Burgerstein Primärhefe 124
Burgerstein Spirulina 126

Le Compendium online: www.burgerstein.ch

Dans la rubrique «Produits» vous trouvez continuellement la nouvelle situation des produits Burgerstein.

Préparations combinées

Burgerstein Anti-Ox

Capsules avec des vitamines antioxydantes et des oligo-éléments comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cps.)	AJR*		apport/j. (1 cps.)	AJR*
Valeur énergétique	28 kJ / 7 kcal	-	Vitamine B1	1,4 mg	127%
Protéines	0,5 g	-	Vitamine B2	1,6 mg	114%
Glucides	0,2 g	-	Niacine	18 mg	112%
dont des polyols	0,1 g	-	Vitamine B6	2 mg	143%
Lipides	0,5 g	-	Zinc	10 mg	100%
dont acides gras saturés	0,5 g	-	Manganèse	2 mg	100%
Fibres alimentaires	0,0 g	-	Molybdène	50 µg	100%
Sodium	< 0,01 g	-	Sélénium	55 µg	100%
Bêta-Carotène	2 mg	42%	L-méthionine	200 mg	-
Vitamine C	60 mg	75%			
Vitamine E (sous forme de mélange de tocopherérols)	12 mg	-			
dont vitamine E (sous forme de d-alpha-tocophérol)	4 mg	33%			

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Agent de charge (huile de soja), gélatine alimentaire, L-méthionine, humectant (glycérol), gluconate de zinc, ascorbate de calcium, gluconate de manganèse, nicotinamide, émulsifiant (lécithine de soja), mélange de tocophérols, vitamine B6, vitamine B1, extrait de carotène d'algues marines, colorants (oxydes de fer), vitamine B2, molybdate de sodium, sélénate de sodium.

Description

Burgerstein Anti-Ox contient dans un mélange équilibré des vitamines, des oligo-éléments et l'acide aminé L-méthionine, éléments à action antioxydante et protège ainsi les tissus et les cellules des radicaux libres et des liaisons oxygénées très réactives.

Mode d'emploi

Prendre 1 capsule par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué en Allemagne.

Burgerstein Anti-Ox, 100 capsules

Burgerstein B-Komplex

Comprimés avec vitamines B, vitamine C, magnésium et choline pour les personnes au besoin accru

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cpr.)	AJR*		apport/j. (1 cpr.)	AJR*
Val. énergétique	2,5 kJ / 0,6 kcal	-	Vitamine B6	4,2 mg	300%
Protéines	0,0 g	-	Vitamine B12	7,5 µg	300%
Glucides	< 0,1 g	-	Niacine	48 mg	300%
dont des alc. monovalent	< 0,1 g	-	Acide pantothénique	18 mg	300%
Lipides	< 0,1 g	-	Biotine	150 µg	300%
dont ac. gras insaturés	< 0,1 g	-	Acide folique	400 µg	200%
Fibres alimentaires	0,0 g	-	Vitamine C	240 mg	300%
Sodium	0,0 g	-	Magnésium	60 mg	16%
Vitamine B1	3,3 mg	300%	Bitrate de choline	80 mg	-
Vitamine B2	4,2 mg	300%			

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Agents de charge (cellulose, hydroxypropylcellulose, hydroxypropylméthylcellulose), vitamine C, magnésium (oxyde de magnésium, citrate de magnésium), bitartrate de choline, niacinamide, anti-agglomérants (mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires, dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras, huile de coco), agents d'enrobage (amidon modifié à base de maïs, dioxyde de titane, hydroxypropylcellulose, citrate de sodium), pantothénate de calcium, biotine, vitamine B6, colorants (oxydes de fer), vitamine B1, vitamine B2, vitamine B12, acide folique.

Description

Les vitamines B participent à de nombreux processus métaboliques importants. Burgerstein B-Komplex contient toutes les 8 vitamines du groupe B, ainsi que la vitamine C, le magnésium et la choline, afin de soutenir de manière optimale le système nerveux et le métabolisme énergétique.

Mode d'emploi

Prendre 1 comprimé par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué aux Etats Unis.

Burgerstein B-Komplex, 100 comprimés

Burgerstein ChondroVital

Complément alimentaire avec sulfate de glucosamine et sulfate de chondroïtine, vitamines et oligo-éléments

Indication nutritionnelle

	apport/j. (3 cpr.)	AJR*		apport/j. (3 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	28 kJ / 7 kcal	-	Vitamine E	24 mg	200%
Protéines	< 0,1 g	-	Vitamine K	75 µg	100%
Glucides	1,3 g	-	Zinc	10 mg	100%
Lipides	0,1 g	-	Manganèse	2 mg	100%
dont acides gras saturés	0,1 g	-	Cuivre	1 mg	100%
Fibres alimentaires	0,9 g	-	Sélénium	55 µg	100%
Sodium	< 0,1 g	-	Sulfate de glucosamine (KCl)	1230 mg	-
Niacine	32 mg	200%	Sulfate de chondroïtine	500 mg	-
Vitamine C	160 mg	200%			
Vitamine D3	7,5 µg	150%			

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Agents de charge (cellulose, phosphate dicalcique, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée), sulfate de glucosamine à base de crustacés, sulfate de chondroïtine sodique, sulfate de glucosamine potassique à base de crustacés, anti-agglomérants (mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires, dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras), vitamine C, agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, talc, fécule de maïs modifié, arôme (caramel), stabilisant (triacétate de glycéryle)), mélange de tocophérols, bisglycinate de zinc, niacinamide, bisglycinate de manganèse, bisglycinate de cuivre, vitamine D3, vitamine K1, sélénate de sodium.

Description

Le sulfate de chondroïtine et la glucosamine sont des composants naturels du tissu conjonctif, des ligaments et du cartilage articulaire. Une alimentation suffisante peut contribuer au maintien de la mobilité articulaire. Burgerstein ChondroVital contient, outre ces deux agents, des vitamines et des oligo-éléments. Burgerstein ChondroVital peut être pris régulièrement et à long terme.

Mode d'emploi

Prendre 3 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. N'est pas recommandé durant la grossesse et l'allaitement, pour les enfants et adolescents et pour les personnes sous anticoagulants.
Développé en Suisse, fabriqué aux Etats Unis.

Burgerstein ChondroVital, 100 ou 210 comprimés

Burgerstein EyeVital

Capsules avec vitamines, minéraux et les caroténoïdes que sont la lutéine et la zéaxanthine comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cps.)	AJR*		apport/j. (1 cps.)	AJR*
Val. énergétique	11 kJ / 2,5 kcal	-	Niacine	18 mg	112%
Protéines	0,2 g	-	Acide folique	200 µg	100%
Glucides	< 0,2 g	-	Vitamine C	60 mg	75%
dont des polyols	< 0,1 g	-	Vitamine E	30 mg	250%
Lipides	< 0,2 g	-	Zinc	10 mg	100%
dont acides gras saturés	< 0,2 g	-	Manganèse	1 mg	50%
Fibres alimentaires	0,0 g	-	Cuivre	1 mg	100%
Sodium	< 0,1 g	-	Sélénium	50 µg	91%
ß-carotène	2 mg	42%	Lutéine	10 mg	-
Vitamine B1	1,4 mg	127%	Zéaxanthine	0,5 mg	-
Vitamine B2	1,6 mg	114%	Taurine	50 mg	-
Vitamine B6	2 mg	143%			

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Gélatine alimentaire, agent de charge (huile de soja), ascorbate de calcium, vitamine E (mélange de tocophérols, d-alpha-tocophérol), gluconate de zinc, humectant (glycérol), taurine, nicotinamide, caroténoïde lutéine, gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, vitamine B6, vitamine B1, extrait de carotène d'algues marines, vitamine B2, colorant (oxyde de fer), caroténoïde zéaxanthine, acide folique, sélénate de sodium.

Description

Burgerstein EyeVital est conçu pour répondre aux besoins de l'oeil. Il contient, outre des vitamines, des oligo-éléments et la taurine, deux caroténoïdes importants et naturels pour l'oeil, à savoir la lutéine et la zéaxanthine. Avec l'âge et sous les sollicitations quotidiennes de la vie professionnelle et des loisirs, les concentrations de lutéine et de zéaxanthine s'abaissent dans la rétine et avec elles la protection contre les rayons UV et les radicaux libres nocifs diminue.

Mode d'emploi

Prendre 1 capsule par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué en Allemagne.

Burgerstein EyeVital, 100 capsules

Burgerstein Grossesse & Allaitement

Complément alimentaire avec vitamines et minéraux pour les besoins particuliers durant la grossesse et l'allaitement

Indication nutritionnelle

	apport/j. (2 cpr.)	AJR*		apport/j. (2 cpr.)	AJR*
Val. énergétique	20 kJ / 5 kcal	-	Acide folique	600 µg	300%
Protéines	0,7 g	-	Vitamine C	160 mg	200%
Glucides	< 0,5 g	-	Vitamine D3	7,5 µg	150%
Lipides	0,1 g	-	Vitamine E	24 mg	200%
dont acides gras saturés	0,1 g	-	Vitamine K	75 µg	100%
Fibres alimentaires	0,4 g	-	Calcium	300 mg	38%
Sodium	< 0,1 g	-	Magnésium	200 mg	53%
Bêta-carotène	2,4 mg	50%	Zinc	10 mg	100%
Vitamine B1	2,2 mg	200%	Fer	30 mg	214%
Vitamine B2	2,8 mg	200%	Manganèse	2 mg	100%
Vitamine B6	2,8 mg	200%	Cuivre	1 mg	100%
Vitamine B12	5 µg	200%	Chrome	40 µg	100%
Niacine	32 mg	200%	Molybdène	50 µg	100%
Acide pantothénique	12 mg	200%	Iode	150 µg	100%
Biotine	100 µg	200%	Sélénium	55 µg	100%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Carbonate de calcium, bisglycinate de calcium, agents de charge (cellulose, carboxyméthylcellulose sodique), bisglycinate de magnésium, oxyde de magnésium, vitamine C, fumarate de fer, anti-agglomérants (mono- et diglycérides d'acides gras, dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras), agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, polydextrose, dioxyde de titane, talc, triglycérides, extrait de radis comme colorant, acide citrique), bisglycinate de zinc, extrait de carotène d'algues marines (caroténoïdes, sucre de canne, huile de soja raffiné, palmitate d'ascorbyle, vitamine E, dioxyde de silicium, gélatine alimentaire), nicotinamide, vitamine E, pantothénate de calcium, bisglycinate de manganèse, biotine, acide folique, sélénate de sodium, molybdate de sodium, vitamine D3, bisglycinate de cuivre, vitamine B6, iodure de potassium, vitamine B2, vitamine B1, fécule de maïs modifié, vitamine K1, vitamine B12, picolinate de chrome.

Description

Les besoins en vitamines, minéraux et oligo-éléments sont augmentés durant et après la grossesse. Burgerstein Grossesse & Allaitement a été conçu spécialement pour couvrir les besoins accrus de la mère durant cette période et pour soutenir le développement de l'enfant.

Mode d'emploi

Prendre 2 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ce produit est indiqué uniquement aux femmes enceintes et qui allaitent.
Développé en Suisse, fabriqué aux Etats Unis.

Burgerstein Grossesse & Allaitement, 100 comprimés, BAG N Nr. 100 686

Burgerstein hair&nails

Comprimés avec millet et algue rouge comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (3 cpr.)	AJR*		apport/j. (3 cpr.)	AJR*
Val. énergétique	10 kJ / 2,5 kcal	-	Acide folique	0,4 mg	200%
Protéines	0,4 g	-	Zinc	10 mg	100%
Glucides	< 0,1 g	-	Cuivre	1 mg	100%
dont des polyols	< 0,1 g	-	Biotine	150 µg	300%
Lipides	< 0,1 g	-	Silicium	200 mg	-
dont acides gras saturés	< 0,1 g	-	L-lysine	100 mg	-
Fibres alimentaires	1,0 g	-	Algues rouges calcaires	800 mg	-
Sodium	< 0,1 g	-	Extrait de millet	500 mg	-
Acide pantothénique	18 mg	300%			

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Algues rouges calcaires (Lithothamnium calcareum), extrait de millet (Panica miliaceum) contenant de la méthionine, dioxyde de silicium, agents de charge (hydroxypropylcellulose, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée), anti-agglomérants (cellulose, mono- et diglycérides d'acides gras, sels de magnésium d'acides gras), chlorhydrate de L-lysine, agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, dioxyde de titane, glycérol), gluconate de zinc, pantothénate de calcium, gluconate de cuivre, colorant (oxyde de fer), biotine.

Description

Burgerstein hair&nails est une formule spéciale destinée à la croissance et aux soins de cheveux et ongles sains. Les extraits de millet et d'algue rouge ainsi qu'un complexe de vitamines et d'oligo-éléments nourrissent la racine des cheveux avec des nutriments précieux et confèrent aux cheveux force et vitalité. Les ongles des doigts sont renforcés et plus résistants. L'idéal est d'utiliser ce produit durant au moins 3 mois.

Mode d'emploi

Prendre 3 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué en Allemagne.

Burgerstein hair&nails, 90 ou 270 comprimés

Burgerstein Multivitamines-minéraux CELA

Comprimés avec vitamines, minéraux et oligo-éléments comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (2 cpr.)	AJR*		apport/j. (2 cpr.)	AJR*
Val. énergétique	10,5 kJ 2,5 kcal	-	Vitamine B12	2,5 µg	100%
Protéines	< 0,2 g	-	Niacine	16 mg	100%
Glucides	< 0,5 g	-	Acide pantothénique	6 mg	100%
Lipides	< 0,2 g	-	Biotine	150 µg	300%
dont acides gras saturés	< 0,2 g	-	Acide folique	600 µg	300%
Fibres alimentaires	0,04 g	-	Calcium	240 mg	30%
Sodium	< 0,1 g	-	Magnésium	120 mg	32%
Vitamine A	0,8 mg	100%	Fer	14 mg	100%
Vitamine D3	5 µg	100%	Zinc	10 mg	100%
Vitamine E	12 mg	100%	Sélénium	55 µg	100%
Vitamine K	75 µg	100%	Cuivre	1 mg	100%
Vitamine C	240 mg	300%	Iode	150 µg	100%
Vitamine B1	1,1 mg	100%	Manganèse	2 mg	100%
Vitamine B2	1,4 mg	100%	Molybdène	50 µg	100%
Vitamine B6	1,4 mg	100%	Chrome	40 µg	100%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Phosphate dicalcique, agents de charge (cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée), vitamine C, oxyde de magnésium, anti-agglomérants (mono- et diglycérides d'acides gras, dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras), glycinate de zinc, agents d'enrobage (polydextrose, hydroxypropylméthylcellulose, dioxyde de titane, triglycérides), fumarate de fer, vitamine E (mélange de tocophérols, d-alpha-tocophérol-succinate), bisglycinate de magnésium, kelp atlantique, bisglycinate de calcium, gluconate de manganèse, niacinamide, gluconate de cuivre, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, pyridoxal 5-phosphate, glycinate de chrome, vitamine B1, vitamine B2, acide folique, molybdate de sodium, biotine, vitamine K1, sélénate de sodium, vitamine D3, vitamine B12.

Description

Burgerstein Multivitamines-minéraux CELA contient des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments qui sont des composants alimentaires essentiels, nécessaires au maintien des processus métaboliques dans l'organisme. Sans leur apport, le corps ne peut pas à partir de l'alimentation récupérer l'énergie qui lui est nécessaire de même que produire les substances qui lui sont propres. C'est la raison pour laquelle ces éléments sont nécessaires pour conserver la santé et assurer la capacité de performances physiques et cérébrales.

Mode d'emploi

Prendre 2 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué aux Etats Unis.

Burgerstein Multivitamin-Mineral CELA, 100 comprimés

Burgerstein skin

Complément alimentaire avec des extraits naturels, la coenzyme Q10 et l'huile d'onagre

Indication nutritionnelle

	Comprimé vert (apport/j.: 1 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	3 kJ / 0,6 kcal	-
Protéines	0,0 g	-
Glucides	< 0,1 g	-
dont des polyols	< 0,01 g	-
Lipides	< 0,1 g	-
dont acides gras saturés	< 0,1 g	-
Fibres alimentaires	0,1 g	-
Sodium	< 0,01 g	-
Vitamine C	120 mg	150%
Acide pantothénique	18 mg	300%
Biotine	150 µg	300%
Sélénium	20 µg	36%
Zinc	10 mg	100%
Extrait de thé vert	500 mg	-
Extrait de grenade	100 mg	-
Coenzyme Q10	30 mg	-
Caroténoïde lycopine	6 mg	-

	Capsule d'huile (apport/j.: 1 cps.)	AJR*
Valeur énergétique	25 kJ / 6 kcal	-
Protéines	< 0,4 g	-
Glucides	< 0,01 g	-
dont des polyols	< 0,01 g	-
Lipides	0,5 g	-
dont acides gras insaturés	0,5 g	-
Fibres alimentaires	0,0 g	-
Sodium	0,0 g	-
Vitamine E	36 mg	300%
Huile d'onagre (cont. 9,5% acide gamma-linolénique)	500 mg	-

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Comprimé vert

Extrait de thé vert des feuilles de Camellia sinensis, vitamine C, agents de charge (cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium reticulée), extrait des fruits de grenade Punica granatum, gluconate de zinc, anti-agglomérants (dioxyde de silicium, talc, sels de calcium d'acides gras), lycopine d'extrait de tomates (alginate de sodium, gomme arabique, amidon de pois), coenzyme Q10, acide pantothénique, agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, shellac, talc, huile d'olive, glycérol), colorants (dioxyde de titane, riboflavin, complexes cuivriques de chlorophylles), biotine, sélénate de sodium.

Capsule d'huile

Huile d'onagre, gélatine, vitamine E, agent d'enrobage (glycérol), colorant (oxyde de titane).

Description

Burgerstein skin, le système de soins efficaces par voie interne pour une peau saine. La formule en 2 phases protège et soigne en même temps.

- Le comprimé vert contient des extraits de plantes sélectionnés à partir de thé vert, de grenade et de tomate (caroténoide lycopène) et est complété par des vitamines, des oligo-éléments et la coenzyme Q10. Pour une protection efficiente contre les influences oxydatives et pour conserver la beauté naturelle de la peau.
- La capsule d'huile avec de l'huile d'onagre pure, pressée à froid et la vitamine E, favorise la souplesse et l'élasticité de la peau.

Mode d'emploi

Prendre 1 comprimé vert le matin et 1 capsule d'huile le soir.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué en Suisse et en Allemagne.

Burgerstein skin, 2 x 30 comprimés/capsules

Burgerstein Sport

Comprimés multivitaminés-minéraux avec un extrait de baies comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cpr.)	AJR*		apport/j. (1 cpr.)	AJR*
Val. énergétique	8 kJ / 2 kcal	-	Acide folique	300 µg	150%
Protéines	< 0,2 g	-	Vitamine C	180 mg	225%
Glucides	< 0,5 g	-	Vitamine D3	7,5 µg	150%
Lipides	< 0,1 g	-	Vitamine E	30 mg	250%
dont acides gras saturés	< 0,1 g	-	Vitamine K	100 µg	133%
Fibres alimentaires	< 0,2 g	-	Calcium	200 mg	25%
Sodium	< 0,1 g	-	Magnésium	100 mg	27%
Bêta-carotène	2 mg	42%	Zinc	8 mg	80%
Vitamine B1	2,4 mg	218%	Fer	12 mg	86%
Vitamine B2	2,6 mg	186%	Manganèse	1,5 mg	75%
Vitamine B6	3 mg	214%	Cuivre	0,8 mg	80%
Vitamine B12	7,5 µg	300%	Chrome	40 µg	100%
Niacine	16 mg	100%	Molybdène	50 µg	100%
Acide pantothénique	15 mg	250%	Iode	50 µg	33%
Biotine	150 µg	300%	Sélénium	55 µg	100%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Carbonate de calcium, vitamine C, agents de charge (cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium reticulée), oxyde de magnésium, bisglycinate de magnésium, anti-agglomérants (mono- et diglycérides d'acides gras, dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras), fumarate de fer, agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, polydextrose, dioxyde de titane, talc, triglycérides), extraits de baies/fruits (myrtille, mûre, fraise, cranberry, raisin, grenade), bisglycinate de zinc, extrait de carotène d'algues marines (caroténoïdes, sucre de cannes, huile de soja raffiné, palmitate d'ascorbyle, vitamine E, dioxyde de silicium, gélatine alimentaire), vitamine E, pantothénate de calcium, niacinamide, vitamine B2, bisglycinate de manganèse, sélénate de sodium, molybdate de sodium, vitamine B6, vitamine D3, vitamine B1, bisglycinate de cuivre, vitamine K1, vitamine B12, acide folique, picolinate de chrome, iodure de potassium, biotine.

Description

Burgerstein Sport est une préparation de base avec multivitamines et minéraux, conçue spécialement pour répondre aux besoins des sportifs. Burgerstein Sport optimise la capacité de performance et favorise la régénération. Les antioxydants ainsi qu'un extrait de baies minimisent en outre le stress oxydatif. Burgerstein Sport peut être dosé individuellement comme complément alimentaire, en pris régulière à long terme. Sans gluten et lactose.

swissski
OFFICIAL SUPPLIER
SWISS TRIATHLON
OFFICIAL PARTNER

Mode d'emploi

Prendre 1 comprimé par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué aux Etats Unis.

Burgerstein Sport, 60 ou 120 comprimés

Burgerstein sun

Capsules avec antioxydants et caroténoïdes naturels comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cps.)	AJR*		apport/j. (1 cps.)	AJR*
Valeur énergétique	13 kJ / 3 kcal	-	Bêta-carotène	9,6 mg	200%
Protéines	0,3 g	-	Vitamine C	120 mg	150%
Glucides	< 0,1 g	-	Vitamine E	18 mg	150%
Lipides	< 0,2 g	-	Sélénium	20 µg	36%
dont acides gras saturés	< 0,2 g	-	Caroténoïde lycopine	6 mg	-
Fibres alimentaires	< 0,1 g	-	Astaxanthine	4 mg	-
Sodium	0,0 g	-			

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Gélatine, vitamine C, extrait naturel de lycopine de tomate, oléorésine à teneur élevée en astaxanthine extraite de la micro-algue Haematococcus pluvialis en huile de chardon, huile végétale, extrait de carotènes d'algues marines en huile d'olive, vitamine E, agent de charge (cire jaune), émulsifiant (lécithine de huile de hélianthe), colorants (oxydes de fer, dioxyde de titane), sélénate de sodium.

Description

Burgerstein sun contient des antioxydants et une combinaison de caroténoïdes naturels (astaxanthine, lycopine, extrait d'algue de mer) dans un dosage optimal. Pour une protection active de votre peau en cas d'exposition au soleil régulière et pour favoriser un bronzage homogène. Les caroténoïdes et les antioxydants peuvent réduire les radicaux libres qui sont responsables d'un vieillissement prématuré de la peau dû à la lumière.
L'idéal serait de commencer à prendre Burgerstein sun au moins 3 semaines avant l'exposition au soleil et de compléter avec des produits antisolaires à usage externe. Une utilisation à long terme est recommandée pour les peaux sensibles.

Mode d'emploi

Prendre 1 capsule par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein sun, 30 capsules

Burgerstein VitaMini

Complément alimentaire destiné aux enfants. Avec vitamines, minéraux et oligoéléments, avec édulcorants

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cpr. à mâcher)	AJR*		apport/j. (1 cpr. à mâcher)	AJR*
Val. énergétique	10 kJ / 2,5 kcal	-	Vitamine C	20 mg	29%
Protéines	0,0 g	-	Vitamine D3	1,7 µg	34%
Glucides	< 1,0 g	-	Vitamine E	4,2 mg	53%
dont des polyols	< 1,0 g	-	Vitamine K	13,3 µg	67%
Lipides	< 0,5 g	-	Calcium	46 mg	7%
Vitamine A	100 µg	14%	Magnésium	23 mg	19%
Vitamine B1	0,33 mg	41%	Zinc	1,6 mg	32%
Vitamine B2	0,4 mg	44%	Fer	1,2 mg	15%
Vitamine B6	0,33 mg	66%	Manganèse	0,67 mg	38%
Vitamine B12	0,66 µg	44%	Cuivre	0,17 mg	23%
Niacine	4,3 mg	43%	Chrome	33 µg	66%
Acide pantothénique	1,6 mg	40%	Molybdène	33,4 µg	64%
Biotine	10 µg	80%	Iode	17 µg	19%
Acide folique	130 µg	43%	Sélénium	6,6 µg	22%

*AJR = Apport journalier recommandé selon les valeurs de rérérence DACH (enfants 4-7 ans)

Ingrédients

Edulcorants (sorbitol, xylitol, glycosides de stéviol extraits de la stévia), lactate de calcium, anti-agglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras, mono- et diglycerides d'acides gras alimentaires), oxyde de magnésium, vitamine C, arômes (abricot, orange, ananas), acidifiant (acide citrique), gluconate de zinc, agent de charge (xanthane), gluconate de manganèse, vitamine E, nicotinamide, fumarate de fer, pantothénate de calcium, colorant (oxyde de fer), gluconate de cuivre, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B2, acide folique, vitamine A, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, vitamine K1, biotine, sélénate de sodium, vitamine D3, vitamine B12.

Description

Burgerstein VitaMini couvre de manière spécifique les besoins en vitamines, minéraux et oligo-éléments chez les enfants de 3 à 12 ans. Grâce à sa composition équilibrée, Burgerstein VitaMini fournit les compléments alimentaires nécessaires, en particulier lors des besoins accrus durant la croissance.

Mode d'emploi

Enfants de 3 à 6 ans mâcher 1 comprimé par jour
Enfants de 6 à 9 ans mâcher 2 comprimés par jour
Enfants de 9 à 12 ans mâcher 3 comprimés par jour

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Peut avoir des effets laxatifs en cas de consommation excessive.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein VitaMini, 100 comprimés à mâcher

Vitamines

Burgerstein C-Berry

Comprimés à mâcher fruités à base de vitamine C comme complimént alimentaires, avec sucre et édulcorant

Indication nutritionnelle

	apport/j. (½ cpr. à mâcher)	AJR*
Valeur énergétique	26 kJ / 6 kcal	-
Protéines	< 0,1 g	-
Glucides	1,4 g	-
dont sucre	1,4 g	-
Lipides	< 0,1 g	-
dont acides gras saturés	< 0,1 g	-
Fibres alimentaires	< 0,1 g	-
Sodium	< 0,1 g	-
Vitamine C	240 mg	300%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients
Dextrose, extrait du fruit de l'acérola, vitamine C, arôme naturel (baies, framboise), anti-agglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras, mono- et diglycérides d'acides gras), colorant (jus de betteraves rouges), édulcorant (thaumatine).

Description
Burgerstein C-Berry sont des comprimés à mâcher fruités à base de vitamine C et à l'arôme naturel de baies. Burgerstein C-Berry constitue avec son concentré de cerises Acerola de grande valeur l'idéal approvisionnement en vitamine C, que ce soit en route ou pour tous les emplois connus de la vitamine C. Chaque ½ comprimé contient 240 mg de vitamine C. Les comprimés étant facilement sécables, Burgerstein C-Berry permet ainsi un dosage individuel pour tous les membres de la famille.

Mode d'emploi
Mâcher un demi comprimé par jour.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué aux Etats-Unis.

Burgerstein C-Berry, 30 comprimés à mâcher

Burgerstein Vitamin A/D

Capsules avec les vitamines A et D3 comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cps.)	AJR*
Valeur énergétique	6,5 kJ / 1,5 kcal	-
Protéines	< 0,1 g	-
Glucides	< 0,1 g	-
dont des polyols	< 0,1 g	-
Lipides	< 0,2 g	-
Vitamine A	600 µg (2000 U.I.)	75%
Vitamine D3	5 µg (200 U.I.)	100%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Agent de charge (huile d'arachide), gélatine alimentaire, humectants (glycérol, sorbitol), vitamine A, vitamine D3.

Description

Les deux vitamines sont indispensables pour une croissance normale. La vitamine A participe à la vision et à la différenciation cellulaire. Elle soutient l'entretien des tissus, surtout à la surface de la peau et au niveau des muqueuses. La vitamine D3 est utile pour conserver des os solides, spécialement durant l'enfance et à un âge avancé, et exerce une action régulatrice sur l'absorption et l'utilisation du calcium.

Mode d'emploi

Prendre 1 capsule par jour au repas.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué en Allemagne.

Burgerstein Vitamin A/D, 240 capsules

Burgerstein Vitamin C-Komplex

Comprimés avec vitamine C et des substances végétales secondaires comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	0,8 kJ / 0,2 kcal	-
Protéines	< 0,1 g	-
Glucides	< 0,1 g	-
dont des polyols	< 0,1 g	-
Lipides	< 0,1 g	-
dont acides gras saturés	< 0,1 g	-
Fibres alimentaires	< 0,5 g	-
Sodium	< 0,01 g	
Vitamine C	240 mg	300%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients
Vitamine C, agents de charge (cellulose, carboxyméthylcellulose sodique), extrait d'écorce de citron, extrait de fleurs de l'arbre aux pagodes du Japon, extrait d'agrumes, poudre du fruit de cynorrhodon, anti-agglomérants (mono- et diglycérides d'acides gras, sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium), agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, polyétyhlèneglycol), amidon modifié.

Description
Burgerstein Vitamin C-Komplex contient, outre la vitamine C, des substances végétales bioactives naturelles en provenance de l'écorce de citron, d'agrumes, de cynorrhodon et de l'arbre des pagodes japonais. Ces substances contribuent à l'édification des tissus et des vaisseaux sanguins et complètent l'action de la vitamine C.

Mode d'emploi
Prendre 1 comprimé par jour avec un peu de liquide.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué aux Etats Unis.

Burgerstein Vitamin C-Komplex, 120 comprimés

Burgerstein Vitamin D_3

Capsules avec vitamine D_3 comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cps.)	AJR*
Valeur énergétique	7 kJ / 1,5 kcal	-
Protéines	< 0,1 g	-
Glucides	< 0,1 g	-
Lipides	< 0,2 g	-
dont acides gras saturés	< 0,2 g	-
Fibres alimentaires	0,0 g	-
Sodium	0,0 g	-
Vitamine D_3	7,5 µg (300 U.I.)	150%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients
Agent de charge (huile de soja), gélatine alimentaire, humectants (glycérol, sorbitol), vitamine D_3.

Description
Burgerstein Vitamine D_3 sert au maintien d'os solides, surtout dans l'enfance et à un âge avancé. La vitamine D_3 exerce en outre une action régulatrice sur l'absorption et l'utilisation du calcium.

Mode d'emploi
Prendre 1 capsule par jour avec un peu de liquide.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué en Allemagne.

Burgerstein Vitamin D_3, 100 capsules

Burgerstein D3 liquid

Vitamine D_3 liquide comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 goutte)	AJR*
Valeur énergétique	1,1 kJ / 0,3 kcal	-
Protéines	0,0 g	-
Glucides	0,0 g	-
Lipides	0,03 g	-
dont acides gras saturés	0,03 g	-
Fibres alimentaires	0,0 g	-
Sodium	0,0 g	-
Vitamine D_3	7,5 µg (300 U.I.)	150%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Agent de charge (huile végétale), vitamine D3, antioxydant (vitamine E).

Description

La vitamine D3 contribue à l'absorption et à l'assimilation du calcium ainsi qu'au maintien d'une masse osseuse normale. La fonction musculaire et le système immunitaire sont également tributaires de quantités suffisantes de vitamine D3. Les enfants ont besoin de vitamine D3 pour une croissance saine et un développement sain des os. Burgerstein D3 liquid ne contient pas d'alcool.

Mode d'emploi

Prendre 1 goutte (= 7,5 µg/300 U.I. de vitamine D3) par jour sans la diluer. La goutte peut être déposée directement dans la bouche ou prise à l'aide d'une cuillère à thé. Tenir le flacon en position verticale.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein D3 liquid, gouttes, 10 ml

Sels-minéraux / oligo-éléments

Burgerstein Calcium D3-Toffees

Bonbons à mâcher à base de calcium et de vitamine D3 comme complément alimentaire, avec arôme à la vanille et sucre

Indication nutritionnelle

	apport/j. (2 bonbons à mâcher)	AJR*
Valeur énergétique	120 kJ / 28 kcal	-
Protéines	< 0,3 g	-
Glucides	5,4 g	-
dont sucre	5,4 g	-
Lipides	0,6 g	-
dont acides gras saturés	0,5 g	-
dont acides gras insaturés	0,1 g	-
Fibres alimentaires	0,0 g	-
Sodium	< 0,1 g	-
Calcium	500 mg	62%
sous forme de carbonate	400 mg	-
sous forme de citrate	100 mg	-
Vitamine D3	7,5 µg	150%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients
Saccharose, sirop de glucose, carbonate de calcium, huile de coco, citrate de calcium, gélatine, lait condensé, miel, arôme naturel de miel, pâte de vanille, arôme (vanilline), vitamine D3, mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires, chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène).

Description
Burgerstein Calcium D3-Toffees sont des bonbons à mâcher vanillés savoureux à base de calcium et de vitamine D3. Le corps a besoin de calcium en tant qu'élément constitutionnel important pour maintenir des os et des dents solides. La vitamine D3 sert à mieux utiliser le calcium. Burgerstein Calcium D3-Toffees peuvent être dosés de manière flexible selon les besoins et sont un complément idéal également pour les enfants.

Mode d'emploi
Mâcher 2 bonbons par jour.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Calcium D3-Toffees, 100 bonbons à mâcher

Burgerstein Chromvital

Comprimés avec du chrome comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	0,04 kJ / 0,01 kcal	-
Protéines	< 0,01 g	-
Glucides	< 0,01 g	-
Lipides	< 0,01 g	-
dont acides gras saturés	< 0,01 g	-
Fibres alimentaires	< 0,05 g	-
Sodium	0,0 g	-
Chrome	40 µg	100%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Agents de charge (cellulose, hydrogénophosphate de calcium), agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, mono- et diglycérides d'acides gras, cellulose), anti-agglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras), picolinate de chrome.

Description

Le chrome est un oligo-élément de nécessité vitale qui contribue au maintien d'une glycémie normale et soutient le métabolisme normal de macronutriments tels que les glucides, les lipides et les protéines.

Mode d'emploi

Prendre 1 comprimé par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué en Allemagne.

Burgerstein Chromvital, 150 comprimés

Burgerstein Dolomit

Comprimés avec calcium et magnésium comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (6 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	22 kJ / 5 kcal	-
Protéines	0,0 g	-
Glucides	1,2 g	-
Lipides	< 0,1 g	-
dont acides gras saturés	< 0,1 g	-
Fibres alimentaires	1,2 g	-
Sodium	0,0 g	-
Calcium	720 mg	90%
Magnésium	360 mg	96%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Carbonate de calcium, agents de charge (cellulose, amidon), amidon modifié, oxyde de magnésium, anti-agglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras), agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, talc).

Description

Burgerstein Dolomit contient du calcium et du magnésium dans un rapport optimal pour l'organisme. Les deux substances minérales contribuent au maintien de la santé osseuse et dentaire ainsi qu'au métabolisme énergétique et à la fonction musculaire normale. Le calcium est nécessaire à une croissance saine et au développement osseux chez les enfants. Le magnésium est important pour l'équilibre électrolytique et la fonction du système nerveux.

Mode d'emploi

Prendre jusqu'à 6 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Dolomit, 240 comprimés

Burgerstein Dolomit plus

Comprimés avec calcium, magnésium et vitamine D3 comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (5 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	35 kJ / 8 kcal	-
Protéines	2,0 g	-
Glucides	< 0,1 g	-
Lipides	0,1 g	-
dont acides gras saturés	0,1 g	-
Fibres alimentaires	< 0,2 g	-
Sodium	< 0,1 g	-
Calcium	800 mg	100%
Magnésium	300 mg	80%
Vitamine D3	7,5 µg	150%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Calcium (bisglycinate de calcium, carbonate de calcium), magnésium (bisglycinate de magnésium, oxyde de magnésium), agents de charge (cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, sels de calcium d'acides gras), anti-agglomérants (dioxyde de silicium, mono- et diglycérides d'acides gras), agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, amidon modifié à base de maïs, huile de coco), vitamine D3.

Description

Burgerstein Dolomit plus contient du calcium et du magnésium sous forme de liaisons pour une utilisation optimale par l'organisme. Ces deux minéraux sont des éléments structurels indispensables pour des os solides et des dents saines. Ils jouent un rôle important dans le métabolisme musculaire, lors de la conduction de l'excitation dans le système nerveux ainsi que dans le métabolisme énergétique. Grâce à l'adjonction de vitamine D3, l'absorption du calcium peut être améliorée.

Mode d'emploi

Prendre jusqu'à 5 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué aux Etats Unis.

Burgerstein Dolomit plus, 150 comprimés

Burgerstein Eisen plus

Capsules avec fer, vitamines B, vitamines C et A et cuivre comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cps.)	AJR*		apport/j. (1 cps.)	AJR*
Valeur énergétique	9 kJ / 2 kcal	-	Vitamine A	800 µg	100%
Protéines	< 0,2 g	-	Vitamine B1	1,4 mg	127%
Glucides	< 0,1 g	-	Vitamine B2	1,6 mg	114%
dont des polyols	< 0,1 g	-	Vitamine B6	2 mg	143%
Lipides	< 0,2 g	-	Vitamine B12	2,5 µg	100%
dont ac. gras insaturés	< 0,2 g	-	Acide pantothénique	6 mg	100%
Fibres alimentaires	0,0 g	-	Acide folique	200 µg	100%
Sodium	0,0 g	-	Vitamine C	60 mg	75%
Fer	14 mg	100%	Cuivre	1 mg	100%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Agents de charge (huile végétale partiellement hydrogéné, huile d'arachides, mannitol), gélatine alimentaire, ascorbate de calcium, fumarate de fer, humectant (glycérol), pantothénate de calcium, émulsifiant (lécithine de soja), gluconate de cuivre, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A, colorants (oxydes de fer), acide folique, vitamine B12.

Description

Le fer sert à la formation de globules rouges et d'hémoglobine et permet le transport de l'oxygène dans le corps. Il est donc important pour le métabolisme énergétique et aide à moins se fatiguer et à se remettre de la fatigue. Burgerstein Eisen plus contient du fer sous une forme organique pour une assimilation optimale, ainsi que d'autres nutriments importants. La préparation est bien tolérée et peut être prise régulièrement et à long terme.

Mode d'emploi

Prendre 1 capsule par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué en Allemagne.

Burgerstein Eisen plus, 150 capsules

Burgerstein Kalzium plus+

Comprimés avec des vitamines et minéraux comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (6 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	11 kJ / 2,5 kcal	-
Protéines	0,0 g	-
Glucides	0,5 g	-
Lipides	< 0,1 g	-
dont acides gras saturés	< 0,1 g	-
Fibres alimentaires	0,6 g	-
Sodium	< 0,1 g	-
Vitamine C	80 mg	100%
Vitamine B6	2 mg	143%
Acide folique	200 µg	100%
Vitamine K	112,5 µg	150%
Vitamine D3	7,5 µg	150%
Calcium	800 mg	100%
Magnésium	300 mg	80%
Zinc	10 mg	100%
Manganèse	2 mg	100%
Cuivre	1 mg	100%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Carbonate de calcium, agents de charge (cellulose, amidon, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée), oxyde de magnésium, anti-agglomérants (mono- et diglycérides d'acides gras, talc, dioxyde de silicium), ascorbate de calcium, gluconate de zinc, agent d'enrobage (shellac), gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, vitamine B6, acide folique, vitamine K1, vitamine D3.

Description

Burgerstein Kalzium plus+ complète l'alimentation de manière ciblée avec divers vitamines et minéraux qui peuvent participer au maintien d'une masse osseuse intacte. Le calcium et le magnésium sont des éléments structurels indispensables pour maintenir des os et des dents solides. Les autres micronutriments contenus dans Burgerstein Kalzium plus+ jouent un rôle important dans le métabolisme osseux.

Mode d'emploi

Prendre jusqu'à 6 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Kalzium plus+, 180 comprimés

Burgerstein Kalziumvital

Comprimés avec calcium comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (5 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	48 kJ / 11 kcal	-
Protéines	0,0 g	-
Glucides	< 3,5 g	-
Lipides	< 0,1 g	-
dont acides gras saturés	< 0,1 g	-
Fibres alimentaires	< 0,6 g	-
Sodium	< 0,05 g	-
Calcium	750 mg	94%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Lactate de calcium, agents de charge (cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée), anti-agglomérants (mono- et diglycérides d'acides gras, sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium), agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, maltodextrine, triglycérides).

Description

Un apport régulier du calcium, substance minérale de nécessité vitale, contribue à édifier des os solides et des dents saines. Le calcium joue également un rôle important lors de la conduction de l'excitation dans le système nerveux et durant la contraction musculaire. Burgerstein Kalziumvital contient du lactate de calcium organique, bien utilisable.

Mode d'emploi

Prendre jusqu'à 5 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué aux Etats Unis.

Burgerstein Kalziumvital, 100 comprimés

Burgerstein Magnesiumvital

Comprimés avec magnésium comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (2 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	37 kJ / 9 kcal	-
Protéines	2,0 g	-
Glucides	< 0,1 g	-
Lipides	< 0,1 g	-
dont acides gras saturés	< 0,1 g	-
Fibres alimentaires	0,4 g	-
Sodium	< 0,1 g	-
Magnésium	300 mg	80%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Aspartate de magnésium, agents de charge (cellulose, amidon, carboxyméthylcellulose de sodium reticulée), stabilisant (mono- et diglycérides d'acides gras), agents d'enrobage (shellac, huile d'olive), anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras).

Description

Le magnésium a plusieurs fonctions essentielles dans le métabolisme. Il soutient la fonction du système nerveux et des muscles et joue un rôle important pour la santé osseuse et dentaire et l'équilibre du bilan électrolytique. Le magnésium participe en outre à la division cellulaire et contribue à la normalité du métabolisme énergétique et de la fonction psychique. Le magnésium aide aussi à moins se fatiguer et à se remettre de la fatigue. Burgerstein Magnesiumvital contient de l'aspartate de magnésium, une forme organique facile à assimiler.

Mode d'emploi

Prendre 2 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Magnesiumvital, 120 comprimés

Burgerstein Mélange de bases

Complément alimentaire avec des sels minéraux alcalins et du fructose

Indication nutritionnelle

	apport/j. (2 c. à thé = ca. 10 g)	AJR*
Valeur énergétique	85 kJ / 20 kcal	-
Protéines	0,0 g	-
Glucides	5,1 g	-
Lipides	0,0 g	-
dont acides gras saturés	0,0 g	-
Fibres alimentaires	0,0 g	-
Sodium	0,2 g	-
Calcium	800 mg	100%
Magnésium	300 mg	80%
Potassium	300 mg	15%
Zinc	10 mg	100%
Manganèse	2 mg	100%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Fructose (50%), carbonate de calcium, carbonate de magnésium, bicarbonate de sodium, bicarbonate de potassium, gluconate de zinc, gluconate de manganèse.

Description

Burgerstein Mélange de bases est une préparation alcaline moderne contenant une combinaison équilibrée de sels minéraux alcalins et d'oligo-éléments. La préparation aide à harmoniser le bilan acido-basique. Sa composition en fait aussi une préparation de sels minéraux idéale. Burgerstein Mélange de bases est édulcoré au fructose, ce qui lui donne une saveur agréable. Ne contient pas d'additifs étrangers à l'organisme tels que colorants et conservateurs.

Mode d'emploi

Dissoudre 2 cuillères à thé rases dans un verre d'eau et boire.

Remarque

Conserver bien fermé dans un endroit frais et sec. Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Mélange de bases, poudre buvable, 180 g ou 700 g

Burgerstein Multimineral

Comprimés avec des minéraux et oligo-éléments comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	2,6 kJ / 0,6 kcal	-
Protéines	< 0,1 g	-
Glucides	< 0,1 g	-
dont des polyols	< 0,1 g	-
Lipides	< 0,1 g	-
dont acides gras saturés	< 0,1 g	-
Fibres alimentaires	< 0,2 g	-
Sodium	< 0,01 g	-
Calcium	240 mg	30%
Magnésium	120 mg	32%
Zinc	3,3 mg	33%
Fer	4,2 mg	30%
Manganèse	1,67 mg	83%
Cuivre	0,33 mg	33%
Chrome	40 µg	100%
Molybdène	50 µg	100%
Sélénium	20 µg	36%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients
Carbonate de calcium, agents de charge (cellulose, mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, sels de magnésium d'acides gras), oxyde de magnésium, gluconate de zinc, fumarate de fer, levure enrichie en sélénium, gluconate de manganèse, agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, amidon modifié à base de maïs, dioxyde de silicium, huile de coco raffinée), gluconate de cuivre, picolinate de chrome, molybdate de sodium.

Description
Burgerstein Multimineral contient d'importants minéraux et oligo-éléments qui sont indispensables au métabolisme. Burgerstein Multimineral est un complément idéal à une préparation multivitaminée et peut être pris à tout âge.

Mode d'emploi
Prendre 1 comprimé par jour avec un peu de liquide.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ce produit est indiqué uniquement aux femmes enceintes et qui allaitent.
Développé en Suisse, fabriqué aux Etats Unis.

Burgerstein Multimineral, 100 comprimés

Burgerstein Probase

Poudre buvable - Complément alimentaire avec des sels minéraux alcalins

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 c. à thé = ca. 5 g)	AJR*
Valeur énergétique	1,5 kJ / 0,4 kcal	-
Protéines	0,0 g	-
Glucides	0,1 g	-
Lipides	0,0 g	-
dont acides gras saturés	0,0 g	-
Fibres alimentaires	0,0 g	-
Sodium	0,2 g	-
Calcium	800 mg	100%
Magnésium	300 mg	80%
Potassium	300 mg	15%
Zinc	10 mg	100%
Manganèse	2 mg	100%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Carbonate de calcium, carbonate de magnésium, bicarbonate de potassium, bicarbonate de sodium, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), gluconate de zinc, gluconate de manganèse.

Description

Burgerstein Probase est une préparation alcaline moderne contenant une combinaison équilibrée de sels minéraux alcalins et d'oligo-éléments. Burgerstein Probase aide à harmoniser le bilan acido-basique. Sa composition en fait aussi une préparation de sels minéraux idéale. Burgerstein Probase est une poudre aisément soluble au goût neutre qui ne contient ni sucre, ni édulcorants et est exempte d'additifs étrangers à l'organisme tels que colorants et conservateurs. Egalement disponible en comprimés.

Mode d'emploi

Dissoudre 1 cuillère à thé rase dans un verre d'eau et boire.

Remarque

Conserver bien fermé dans un endroit sec. Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Probase, poudre buvable, 125 ou 400 g

Burgerstein Comprimés de Probase

Complément alimentaire avec des sels minéraux alcalins

Indication nutritionnelle

	apport/j. (5 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	6 kJ / 1,5 kcal	-
Protéines	0,0 g	-
Glucides	0,3 g	-
Lipides	< 0,1 g	-
dont acides gras saturés	< 0,1 g	-
Fibres alimentaires	< 0,1 g	-
Sodium	0,2 g	-
Calcium	800 mg	100%
Potassium	300 mg	15%
Magnésium	300 mg	80%
Zinc	10 mg	100%
Manganèse	2 mg	100%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Carbonate de calcium, carbonate de magnésium, bicarbonate de potassium, bicarbonate de sodium, agents d'enrobage (shellac, talc, hydroxypropylméthylcellulose), amidon modifié, anti-agglomérants (sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium), gluconate de zinc, gluconate de manganèse.

Description

Burgerstein Comprimés de Probase contient une combinaison équilibrée de sels minéraux alcalins et d'oligo-éléments sous une forme galénique moderne. La préparation aide à harmoniser le bilan acido-basique. La composition de Burgerstein Comprimés de Probase en fait aussi une préparation de sels minéraux idéale. Les comprimés sont gastrorésistants. Egalement disponible en poudre.

Mode d'emploi

Prendre 5 comprimés par jour avec un verre d'eau. La prise des comprimés peut être répartie dans la journée.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Comprimés de Probase, 150 ou 300 comprimés

Burgerstein Selenvital

Complément de levure avec sélénium comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	5,5 kJ / 1,3 kcal	-
Protéines	< 0,2 g	-
Glucides	< 0,2 g	-
Lipides	< 0,1 g	-
dont acides gras saturés	< 0,1 g	-
Fibres alimentaires	0,0 g	-
Sodium	0,0 g	-
Sélénium	55 µg	100%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Levure de bière (Saccharomyces cerevisiae, pasteurisée), levure de sélénium, stabilisants (polyvinylpyrrolidone, mono- et diglycérides d'acides gras), fructose, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), agent d'enrobage (shellac).

Description

Le sélénium possède des propriétés antioxydatives et protège l'organisme contre les réactions oxydantes en captant les radicaux libres et les liaisons oxygénées hautement réactives.

Mode d'emploi

Prendre 1 comprimé par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Selenvital, 100 comprimés

Burgerstein Zink-C

Bonbons à sucer à base de zinc et vitamine C avec l'arôme naturel d'orange et sucre comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 bonbon à sucer)	AJR*
Valeur énergétique	70 kJ / 17 kcal	-
Protéines	< 0,2 g	-
Glucides	3,5 g	-
dont sucre	3,5 g	-
Lipides	< 0,2 g	-
dont acides gras saturés	< 0,2 g	-
Fibres alimentaires	0,0 g	-
Sodium	< 0,1 g	-
Vitamine C	80 mg	100%
Zinc	10 mg	100%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients
Saccharose, sirop de glucose, eau, huile de coco, gélatine alimentaire, vitamine C, citrate de zinc, concentré de jus d'orange, arôme (orange), colorant (bêta-carotène).

Description
Burgerstein Zink-C sont des bonbons à sucer à base de zinc et de vitamine C, à l'arôme naturel d'orange. Le contact des composants avec la muqueuse pharyngée permet d'obtenir un effet local. Le zinc participe à de nombreux processus métaboliques dont entre autres, également la réponse immunitaire. La vitamine C complète le zinc de manière optimale.

Mode d'emploi
Sucer 1 bonbon par jour.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Zink-C, 115 g/ca. 25 bonbons à mâcher

Burgerstein Zinkvital

Comprimés avec zinc comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	2 kJ / 0,5 kcal	-
Protéines	0,0 g	-
Glucides	0,1 g	-
Lipides	< 0,1 g	-
dont acides gras saturés	< 0,1 g	-
Fibres alimentaires	0,0 g	-
Sodium	0,0 g	-
Zinc	10 mg	100%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Agents de charge (phosphate dicalcique, amidon), gluconate de zinc, anti-agglomérants (mono- et diglycérides d'acides gras, dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras), agent d'enrobage (shellac).

Description

Le zinc soutient le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines et participe à la division cellulaire. Il contribue à la fertilité et à la fonction reproductrice normales, à l'entretien de la peau, des cheveux, des ongles et des os ainsi qu'à la conservation de l'acuité visuelle. Le système immunitaire lui aussi est tributaire d'apports suffisants en zinc.

Mode d'emploi

Prendre 1 comprimé par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Zinkvital, 100 comprimés

Burgerstein Omega-3 DHA

Capsules avec DHA et EPA en provenance d'huiles de poisson, comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (2 cps.)	AJR*
Valeur énergétique	41 kJ / 10 kcal	-
Protéines	0,2 g	-
Glucides	0,1 g	-
dont des polyols	0,1 g	-
Lipides	1,0 g	-
dont:		
Acides gras saturés	55 mg	-
Acides gras trans	< 5 mg	-
Acides gras monoinsaturés	115 mg	-
Acides gras polyinsaturés	775 mg	-
dont acides gras oméga-3	600 mg	-
(420 mg DHA et 80 mg EPA)		-
Cholestérol	5 mg	-
Fibres alimentaires	0,0 g	-
Sodium	0,0 g	-
Vitamine E	15 mg	125%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients
D'acides gras d'huiles de poisson, gélatine alimentaire, humectants (glycérol, sorbitol), vitamine E (mélange de tocophérols, d-alpha-tocophérol), arôme (caramel).

Description
Un approvisionnement suffisant en oméga-3 DHA chez l'adulte contribue au maintien d'une fonction cérébrale et d'une capacité visuelle normales (efficace à partir de 250 mg de DHA et d'EPA par jour). La prise d'Omega-3 DHA par la mère favorise en outre le développement des yeux et du cerveau du fœtus et du nourrisson allaité. Les effets positifs pour le fœtus/nourrisson s'installent lorsque la mère prend 200 mg de DHA par jour en plus de la dose journalière d'acides gras oméga-3 recommandée chez l'adulte.
Burgerstein Omega-3 DHA contient des acides gras oméga-3 à haute concentration, obtenus à partir d'huile de poisson pure, avec un pourcentage élevé en DHA. La préparation est bien tolérée et peut être prise régulièrement et à long terme.

Mode d'emploi
Prendre 2 capsules par jour au repas.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué en Allemagne.

Burgerstein Omega-3 DHA, 100 capsules

Burgerstein Omega-3 EPA

Capsules avec EPA et DHA en provenance d'huiles de poisson, comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cps.)	AJR*
Valeur énergétique	30 kJ / 7,5 kcal	-
Protéines	0,2 g	-
Glucides	< 0,1 g	-
dont des polyols	< 0,1 g	-
Lipides	0,7 g	-
dont:		
Acides gras saturés	7 mg	-
Acides gras trans	< 1 mg	-
Acides gras monoinsaturés	7 mg	-
Acides gras polyinsaturés	658 mg	-
dont acides gras Oméga-3	565 mg	-
(375 mg EPA et 110 mg DHA)		97%
Cholestérol	< 1 mg	-
Fibres alimentaires	0,0 g	-
Sodium	0,0 g	-
Vitamine E	7,5 mg	62%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

D'acides gras d'huiles de poisson, gélatine alimentaire, humectants (glycérol, sorbitol), vitamine E (mélange de tocophérols, d-alpha-tocophérol).

Description

Les acides gras oméga-3 EPA et DHA contribuent à une fonction cardiaque normale (effet positif à partir de 250 mg d'EPA et de DHA par jour). En leur qualité d'acides gras polyinsaturés, l'EPA et le DHA servent aussi au maintien d'un taux de cholestérol normal dans le sang.
Burgerstein Omega-3 EPA contient des acides gras oméga-3 à haute concentration, obtenus à partir d'huile de poisson pure, avec un pourcentage élevé en EPA. La préparation est bien tolérée et peut être prise régulièrement et à long terme.

Mode d'emploi

Prendre 1 capsule par jour au repas.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué en Allemagne.

Burgerstein Omega-3 EPA, 50 ou 100 capsules

Acides aminés

Burgerstein Aminovital

Poudre d'acides aminés avec taurine, vitamines, édulcorants et arôme de pamplemousse pour les personnes au besoin accru

Indication nutritionnelle

	apport/j. (sachet à 12 g)	AJR*		apport/j. (sachet à 12 g)	AJR*
Val. énergétique	147 kJ / 34 kcal	-	Taurine	1 g	-
Protéines	6,4 g	-	L-ornithine	0,55 g	-
Glucides	3,3 g	-	L-lysine	0,4 g	-
dont des polyols	1,6 g	-	Niacine	16 mg	100%
Lipides	0,0 g	-	Acide pantothénique	6 mg	100%
dont acides gras saturés	0,0 g	-	Vitamine B6	1,4 mg	100%
Fibres alimentaires	0,0 g	-	Vitamine B12	2,5 µg	100%
Sodium	0,0 g	-	Magnésium	125 mg	33%
L-glutamine	2,5 g	-	Zinc	5 mg	50%
L-arginine	2 g	-	Manganèse	1 mg	50%
L-glycine	1 g	-			

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

L-glutamine, L-arginine, acidifiant (acide citrique), glycérophosphate de magnésium, édulcorants (xylitol, sorbitol), L-glycine, taurine, chlorhydrate de L-ornithine, chlorhydrate de L-lysine, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), arôme (pamplemousse), gluconate de zinc, nicotinamide, pantothénate de calcium, gluconate de manganèse, vitamine B6, vitamine B12.

Description

Burgerstein Aminovital est un mélange équilibré d'acides aminés avec taurine, oligo-éléments et vitamines. Le produit idéal pour les personnes avec un besoin accru. Revitalise le corps et l'esprit.

Mode d'emploi

Prendre 1 sachet de 12 g par jour dans un verre de boisson fruitée ou d'eau, bien remuer et boire.

Remarque

Au sec et à une température comprise entre 15° et 25°C. Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Aminovital, 240 g, 20 sachets

Burgerstein Creatin

Comprimés avec créatine pour les personnes au besoin accru

Indication nutritionnelle

	apport/j. (5 cpr.)
Valeur énergétique	88 kJ / 21 kcal
Protéines	3,8 g
Glucides	< 0,3 g
Lipides	< 0,6 g
dont acides gras saturés	< 0,6 g
Fibres alimentaires	0,5 g
Sodium	< 0,01 g
Créatine	3,75 g

Chaque comprimé contient: 750 mg de créatine

Ingrédients
Créatine monohydrate, agents de charge (cellulose, amidon, carboxy méthylcellulose de sodium réticulée, amidon modifié), antiagglomérants (mono et diglycérides d'acides gras, sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium), agent d'enrobage (shellac), colorant (oxyde de fer).

Description
Accroît la performance pour les efforts de courte durée dans le domaine anaérobie. Joue un rôle important pour assurer une fonction musculaire normale.

Mode d'emploi
Prendre jusqu'à 5 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ne convient pas aux enfants ni aux jeunes en période de croissance. Non destiné à une prise prolongée. Peut entraîner une prise de poids.
Développé en Suisse, fabriqué aux Etats-Unis.

Burgerstein Creatin, 100 comprimés

Burgerstein Energy

Glucides et protéines sous forme de poudre avec vitamines pour les personnes au besoin accru, avec poudre du fruit ananas et sucre

Indication nutritionnelle

	apport/j. (3 cuill. à soupe bombées)	AJR*
Valeur énergétique	399 kJ / 93 kcal	-
Protéines	6,5 g	-
Glucides	22,1 g	-
Lipides	< 0,1 g	-
Vitamine B1	1,4 mg	127%
Vitamine C	60 mg	75%
Vitamine E	10 mg	83%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients
Protéines hydrolysées (de viande), poudre de fruit d'ananas, dextrose, amidon modifié, fructose, vitamine C, vitamine E, vitamine B1.

Description
Burgerstein Energy est une poudre fruitée à base de glucides et de protéines avec diverses vitamines qui approvisionne rapidement et durablement l'organisme en énergie. Elle peut être prise dans du liquide avant, durant ou après une performance sportive.

Mode d'emploi
Mélanger 3 cuillères à soupe bombées (env. 30 g) avec un liquide de votre choix (avant et pendant la performance sportive: avec de l'eau, après la performance: avec de l'eau, du jus de fruits, du lait etc.).

Remarque
Conserver bien fermé, dans un endroit frais et sec. Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué en Allemagne.

Burgerstein Energy, 470 g poudre buvable

Burgerstein L-Arginin

Comprimés avec L-aginine pour les personnes au besoin accru

Indication nutritionnelle

	apport/j. (4 cpr.)
Valeur énergétique	66 kJ / 16 kcal
Protéines	2,0 g
Glucides	1,8 g
Lipides	< 0,1 g
dont acides gras saturés	< 0,1 g
Fibres alimentaires	0,5 g
Sodium	< 0,1 g
L-arginine	2 g

Chaque comprimé contient: 500 mg de L-arginine

Ingrédients
L-arginine, amidon modifié, agents de charge (cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium reticulée), anti-agglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras), agent d'enrobage (shellac, huile d'olive), colorant (oxyde de fer).

Description
L-arginine contribue à une bonne oxygénation des muscles, joue un rôle important au niveau du système immunitaire et favorise une régénération optimale. Stimule la combustion des graisses et facilite une régulation saine du métabolisme lipidique.

Mode d'emploi
Prendre jusqu'à 4 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein L-Arginin, 100 comprimés

Burgerstein L-Arginin L-Ornithin

Comprimés avec L-arginine et L-ornithine pour les personnes au besoin accru

Indication nutritionnelle

	apport/j. (4 cpr.)
Valeur énergétique	69 kJ / 16 kcal
Protéines	3,0 g
Glucides	1,0 g
Lipides	< 0,1 g
dont acides gras saturés	< 0,1 g
Fibres alimentaires	0,1 g
Sodium	< 0,1 g
L-arginine	2 g
L-ornithine	1 g

Chaque comprimé contient: 500 mg de L-arginine, 250 mg de L-ornithine

Ingrédients
L-arginine, chlorhydrate de L-ornithin, amidon, amidon modifié, agent de charge (carboxyméthylcellulose de sodium reticulée), anti-agglomérants (sels de magnésium d'acides gras, mono- et diglycérides d'acides gras), colorants (oxydes de fer), agents d'enrobage (shellac, huile d'olive).

Description
L-arginine et L-ornithine sont deux acides aminés très étroitement apparentés qui jouent un rôle important dans l'édification musculaire et le système immunitaire. Les deux trouvent leur utilisation dans la pratique de la musculation.

Mode d'emploi
Prendre jusqu'à 4 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein L-Arginin L-Ornithin, 100 comprimés

Burgerstein L-Carnitin

Comprimés avec L-carnitine pour les personnes au besoin accru

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cpr.)
Valeur énergétique	15 kJ / 3,5 kcal
Protéines	0,6 g
Glucides	< 0,4 g
Lipides	< 0,1 g
dont acides gras saturés	< 0,1 g
Fibres alimentaires	0,2 g
Sodium	< 0,01 g
L-carnitine	600 mg

Chaque comprimé contient: 600 mg de L-carnitine

Ingrédients
L-carnitine-L-tartrate, agents de charge (cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium reticulée), amidon, anti-agglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras), agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, maltodextrine, triglycérides).

Description
La L-carnitine est importante pour le transport d'acides gras à longue chaîne dans les véritables usines cellulaires (les mitochondries) des cellules musculaires où elle rend leur combustion optimale. De ce fait, elle soutient le métabolisme musculaire.
Burgerstein utilise 100% de L-carnitine pure.

Mode d'emploi
Prendre 1 comprimé par jour avec un peu de liquide.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Carnipure™

Burgerstein L-Carnitin, 100 comprimés

Burgerstein L-Cystein

Comprimés avec L-cystéine pour les personnes au besoin accru

Indication nutritionnelle

	apport/j. (2 cpr.)
Valeur énergétique	19 kJ / 4,5 kcal
Protéines	1,0 g
Glucides	0,0 g
Lipides	< 0,1 g
dont acides gras saturés	< 0,1 g
Fibres alimentaires	0,6 g
Sodium	< 0,01 g
L-cystéine	1 g

Chaque comprimé contient: 500 mg de L-cystéine

Ingrédients
L-cystéine, agent de charge (cellulose), anti-agglomérants (mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires, dioxyde de silicium), agents d'enrobage (hydroxypropyl-méthylcellulose, talc).

Description
La L-cystéine est un acide aminé soufré. Elle représente une des sources principales de soufre à partir de l'alimentation de l'homme.

Mode d'emploi
Prendre 2 comprimés par jour avant les repas.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein L-Cystein, 100 comprimés

Burgerstein L-Glutamin

Comprimés avec L-glutamine pour les personnes au besoin accru

Indication nutritionnelle

	apport/j. (2 cpr.)
Valeur énergétique	22 kJ / 5 kcal
Protéines	1,0 g
Glucides	0,0 g
Lipides	0,1 g
dont acides gras saturés	0,1 g
Fibres alimentaires	0,6 g
Sodium	< 0,1 g
L-glutamine	1 g

Chaque comprimé contient: 500 mg de L-glutamine

Ingrédients

L-glutamine, agents de charge (cellulose, hydroxypropylcellulose, carboxyméthylcellulose sodique), anti-agglomérants (mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires, dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras), agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, polydextrose, dioxyde de titane, talc, huile végétale).

Description

La L-glutamine est importante pour la synthèse protidique dans les cellules musculaires et constitue une source d'énergie pour les cellules du système immunitaire et de la muqueuse intestinale. Les besoins en L-glutamine sont augmentés dans les situations de stress.

Mode d'emploi

Prendre 2 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué aux Etats Unis.

Burgerstein L-Glutamin, 100 comprimés

Burgerstein L-Lysin

Comprimés avec L-lysine pour les personnes au besoin accru

Indication nutritionnelle

	apport/j. (2 cpr.)
Valeur énergétique	20 kJ / 5 kcal
Protéines	1,0 g
Glucides	0,0 g
Lipides	< 0,1 g
dont acides gras saturés	< 0,1 g
Fibres alimentaires	0,4 g
Sodium	< 0,1 g
L-lysine	1 g

Chaque comprimé contient: 500 mg de L-lysine

Ingrédients
Chlorhydrate de L-lysine, agents de charge (cellulose, carboxyméthylcellulose sodique, mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires), agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, polydextrose, dioxyde de titane, talc, huile végétale), anti-agglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras).

Description
La L-lysine est un acide aminé essentiel qui joue un rôle important dans le système immunitaire. Elle n'est pas synthétisée par l'organisme et doit être par conséquent fournie par l'alimentation.

Mode d'emploi
Prendre 2 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué aux Etats Unis.

Burgerstein L-Lysin, 30 ou 100 comprimés

Burgerstein L-Methionin

Comprimés avec L-méthionine pour les personnes au besoin accru

Indication nutritionnelle

	apport/j. (2 cpr.)
Valeur énergétique	33 kJ / 8 kcal
Protéines	1,0 g
Glucides	0,8 g
Lipides	< 0,1 g
dont acides gras saturés	< 0,1 g
Fibres alimentaires	< 0,3 g
Sodium	< 0,1 g
L-méthionine	1 g

Chaque comprimé contient: 500 mg de L-méthionine

Ingrédients
L-méthionine, amidon, agents de charge (cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium reticulée), antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras), stabilisant (mono- et diglycérides d'acides gras), agents d'enrobage (shellac, huile d'olive).

Description
La L-méthionine est un acide aminé soufré que le corps est incapable de synthétiser. Elle est un élément structurel important de la peau, des cheveux et des ongles et peut lier les métaux lourds.

Mode d'emploi
Prendre 2 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein L-Methionin, 100 comprimés

Burgerstein Protein

Protéines à faible poids moléculaire pour les personnes au besoin accru

Indication nutritionnelle

	apport/j.
(4 cuillères à soupe rases = env. 28 g)	
Valeur énergétique	440 kJ / 104 kcal
Protéines	23,8 g
dont ac. aminés essentiels	7,9 g
Glucides	1,8 g
Lipides	0,14 g
L-méthionine	0,17 g

Ingrédients

Protéines de petit lait, de soja et de tissu conjonctif avec supplémentation en acides aminés (contient du lactose).

Description

Burgerstein Protein contient un mélange équilibré de protéines de sources différentes, à chaînes courtes et de bonne utilisation. Constitue un aliment d'appoint idéal en cas de besoins accrus (situations de stress, convalescence) et dans tous les cas où il est souhaité d'obtenir une faible charge sur les organes digestifs.

Mode d'emploi

La dose journalière recommandée est d'environ 0,4 g par kilo de poids corporel (env. 4 cuillères à soupe = 28 g), répartie sur deux repas. Burgerstein Protein est soluble dans l'eau, ce qui facilite son administration. 1 cuillère rase de Burgerstein Protein correspond à env. 7 g de poudre.

Remarque

Conserver bien fermé dans un endroit sec. Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Développé en Suisse, fabriqué en Allemagne.

Burgerstein Protein, 350 g poudre

Burgerstein Protein plus

Concentré de protéines avec vitamines et minéraux pour les personnes au besoin accru, avec l'arôme de fleur de sureau et édulcorants

Indication nutritionnelle

(3 cuill. à soupe bombées = 25g)	apport/j.	AJR*	(3 cuill. à soupe bombées = 25g)	apport/j.	AJR*
Val. énergétique	349 kJ / 82 kcal	-	Acide folique	600 µg	300%
Protéines	20,3 g	-	Vitamine B12	2,5 µg	100%
Glucides	< 0,3 g	-	Biotine	150 µg	300%
Lipides	0,0 g	-	Acide pantothénique	18 mg	300%
Fibres alimentaires	< 0,1 g	-	Calcium	400 mg	50%
Sodium	0,01 g	-	Fer	14 mg	100%
Bêta-carotène	2 mg	42%	Magnésium	150 mg	40%
Vitamine D	5 µg	100%	Zinc	10 mg	100%
Vitamine E	10 mg	83%	Sélénium	55 µg	100%
Vitamine C	180 mg	225%	Cuivre	1 mg	100%
Vitamine B1	1,4 mg	127%	Manganèse	2 mg	100%
Vitamine B2	1,6 mg	114%	Chrome	40 µg	100%
Niacine	18 mg	113%	Molybdène	50 µg	100%
Vitamine B6	2 mg	143%			

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Protéines hydrolysées (de viande, soja, petit lait), calcium (carbonate de calcium, citrate de calcium), arômes (poudre de jus de citron, fleurs de sureau), carbonate de magnésium, caroténoïdes des algues de mer, vitamine C, acidifiant (acide citrique), tocophérols mélangés, lactate de fer, édulcorants (aspartame, acésulfame K), levure enrichie en sélénium, pantothénate de calcium, citrate de zinc, agent de charge (lactose), nicotinamide, bisglycinate de manganèse, vitamine B1, bisglycinate de cuivre, vitamine D3, vitamine B6, vitamine B2, acide folique, biotine, picolinate de chrome, molybdate de sodium, vitamine B12.

Description

Burgerstein Protein plus est un aliment d'appoint hautement concentré renfermant toutes les vitamines importantes, tous les sels minéraux et oligo-éléments importants ainsi que des protéines à chaînes courtes, de digestion facile. Les substances nutritives soigneusement sélectionnées de Burgerstein Protein plus – des acides aminés de différentes sources de protéines, de la vitamine E extraite d'huiles végétales ainsi que des minéraux et des oligo-éléments sous forme de chélates – sont très bien assimilables par le corps.

Les protéines contenues dans Burgerstein Protein plus contribuent à l'augmentation et à la conservation de la masse musculaire ainsi qu'au maintien d'une constitution osseuse normale. Burgerstein Protein plus peut être pris lors d'un besoin accru de protéines.

Mode d'emploi

Mélanger 3 cuillères à soupe bombées de Burgerstein Protein plus (env. 25 g) avec du liquide (de préférence lait ou jus de fruits) d'une quantité de votre choix.

Remarque

Avec édulcorants: Contient une source de phénylalanine. Conserver bien fermé dans un endroit sec. Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.

Développé en Suisse, fabriqué en Allemagne.

Burgerstein Protein plus, poudre, 130 g ou 400 g

Burgerstein Taurin

Comprimés avec taurine pour les personnes au besoin accru

Indication nutritionnelle

	apport/j. (2 cpr.)
Valeur énergétique	16 kJ / 4 kcal
Protéines	0,0 g
Glucides	< 1,0 g
Lipides	< 0,1 g
dont acides gras saturés	< 0,1 g
Fibres alimentaires	< 0,3 g
Sodium	< 0,01 g
Taurine	1 g

Chaque comprimé contient: 500 mg de taurine

Ingrédients
Taurine, amidon modifié, agents de charge (cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium reticulée), anti-agglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras), agents d'enrobage (shellac, huile d'olive), colorants (oxydes de fer).

Description
La taurine est une substance analogue aux acides aminés et qui possède des propriétés antioxydantes. Grâce à sa teneur en soufre, elle peut lier les métaux lourds. La taurine trouve une application dans le sport d'endurance.

Mode d'emploi
Prendre 2 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les aliments d'appoint ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Taurin, 100 comprimés

Nutriments divers

Burgerstein Coenzym Q_{10}

Capsules végétales avec la coenzyme Q_{10} comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cps.)
Valeur énergétique	3 kJ / 0,7 kcal
Protéines	0,0 g
Glucides	0,2 g
Lipides	0,0 g
dont acides gras saturés	0,0 g
Fibres alimentaires	< 0,1 g
Sodium	0,0 g
Coenzyme Q_{10}	30 mg

Ingrédients

Agents de charge (lactose, hydroxypropylméthylcellulose), coenzyme Q_{10}, stabilisant (polyvinylpyrrolidone), anti-agglomérant (dioxyde de silicium).

Description

Coenzyme Q_{10} joue un rôle central dans la récupération énergétique cellulaire et agit comme antioxydant puissant dans les véritables usines cellulaires que sont les mitochondries. Burgerstein Coenzym Q_{10} est obtenu à partir de levure.

Mode d'emploi

Prendre 1 capsule par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Coenzym Q_{10}, 60 ou 180 capsules

Burgerstein Coenzym Q_{10}

Comprimés à sucer avec la coenzyme Q_{10} comme complément alimentaire, avec arôme d'orange et édulcorant

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cpr.)
Valeur énergétique	5 kJ / 1,5 kcal
Protéines	0,0 g
Glucides	0,5 g
dont des polyols	0,5 g
Lipides	< 0,1 g
dont acides gras saturés	< 0,1 g
Fibres alimentaires	0,0 g
Sodium	0,0 g
Coenzyme Q_{10}	30 mg

Ingrédients

Agent de charge (mannitol), édulcorant (sorbitol), coenzyme Q_{10}, acidifiant (acide citrique), anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras), arôme (orange), stabilisant (polyvinylpyrrolidone).

Description

Coenzyme Q_{10} joue un rôle central dans la récupération énergétique cellulaire et agit comme antioxydant puissant dans les véritables usines cellulaires que sont les mitochondries. Burgerstein Coenzym Q_{10} est obtenu à partir de levure.

Mode d'emploi

Sucer 1 comprimé par jour.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Peut avoir des effets laxatifs en cas de consommation excessive.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Coenzym Q_{10}, 100 comprimés à sucer

Burgerstein Coenzym Q10 liquid

Coenzyme Q10 liquide comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (5 gouttes)
Valeur énergétique	2,5 kJ / 0,6 kcal
Protéines	0,0 g
Glucides	< 0,2 g
dont des polyols	< 0,2 g
Lipides	< 0,02 g
dont acides gras saturés	< 0,02 g
Fibres alimentaires	0,0 g
Sodium	0,0 g
Coenzyme Q10	30 mg

Ingrédients

Glycérine, coenzyme Q10, huile végétale, émulsifiant (lécithine d'huile soja sans OGM), eau.

Description

La coenzyme Q10 joue un rôle important dans le gain énergétique corporel endogène au niveau cellulaire. La production corporelle de cette coenzyme diminue avec l'âge. La coenzyme Q10, contenue dans Burgerstein Coenzyme Q10 liquid, a été introduite dans une solution selon un procédé de fabrication spécial, ce qui lui confère une très bonne utilisation par l'organisme.

Mode d'emploi

Prendre 5 gouttes (= 30 mg coenzyme Q10) par jour non dilué ou dissout dans un peu d'eau ou de jus de fruit.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué en Allemagne.

Burgerstein Coenzym Q10 liquid, gouttes, 20 ml

Burgerstein Lécithine granulés

Préparation d'additifs alimentaires

Indication nutritionnelle

	apport/j. (1 cuillère à soupe rase = 7 g)
Valeur énergétique	229 kJ / 56 kcal
Protéines	< 0,1 g
Glucides	0,6 g
dont sucre	0,3 g
Lipides	5,9 g
dont acides gras saturés	0,9 g
dont acides gras monoinsaturés	0,4 g
dont acides gras polyinsaturés	2,3 g
Fibres alimentaires	0,0 g
Sodium	< 0,1 g

Ingrédients

Lécithine de soja (émulsifiant, E322), phosphate de calcium (anti-agglomérant, E341).

Description

Burgerstein Lécithine granulés est un produit naturel pur obtenu à partir de fèves soja avec une teneur en lécithine de soja de 98% (sans OGM). La lécithine végétale est exempte de cholestérol et contient des phospholipides essentiels ainsi que des acides gras polyinsaturés.

Mode d'emploi

Prendre 1-2 cuillère(s) à soupe rases par jour.
Burgerstein Lécithine granulés est neutre de goût et peut être pris avec un peu d'eau ou mélangé à des aliments (yoghourt, muesli, etc.).

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver bien fermé dans un endroit sec. Les boîtes entamées doivent être utilisées dans les 60 jours après ouverture.
Fabriqué aux Etas-Unis.

Burgerstein Lécithine granulés, 397 g

Burgerstein Phosphatidyl-Serin PS

Capsules avec phosphatidylsérine comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (3 cps.)
Valeur énergétique	70 kJ / 17 kcal
Protéines	< 0,4 g
Glucides	< 0,1 g
dont des polyols	< 0,1 g
Lipides	1,7 g
dont acides gras saturés	1,7 g
Fibres alimentaires	0,0 g
Sodium	0,0 g
Phosphatidylsérine	300 mg

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients

Extrait de la lécithine de soja contenant la phosphatidylsérine (20%), gélatine bovine, humectants (glycérol, sorbitol), huile végétale (huile de coco raffinée), colorants (dioxyde de titane, oxyde de fer).

Description

Des données scientifiques permettent de conclure que la phosphatidylsérine est en mesure d'influer positivement sur les capacités de performance cérébrale et de ralentir leur dégradation liée au vieillissement. Phosphatidylsérine est également indiquée en cas de fortes exigences.

Mode d'emploi

Prendre 3 capsules par jour avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

MemreePS™ agit sur les fonctions cognitives et est une marque déposée de Lonza SA, Suisse.

Burgerstein Phosphatidyl-Serin PS, 90 capsules, BAG N Nr. 100 775

Burgerstein Primärhefe

Levure primaire - Comprimés de levure de bière avec des vitamines B1, B2 et niacine comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (6 cpr.)	AJR*
Valeur énergétique	92 kJ / 22 kcal	-
Protéines	2,9 g	-
Glucides	1,7 g	-
Lipides	0,4 g	-
dont acides gras saturés	0,2 g	-
Fibres alimentaires	0,6 g	-
Sodium	0,0 g	-
Vitamine B1	2,2 mg	200%
Vitamine B2	3,5 mg	250%
Niacine	24 mg	150%

*AJR = Apport journalier recommandé

Ingrédients
Levure de bière (Saccharomyces cerevisiae, pasteurisée), stabilisants (phosphate dicalcique, mono- et diglycérides d'acides gras), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), agent d'enrobage (shellac).

Description
Burgerstein levure primaire contient de la levure de bière qui croît dans des conditions soumises à un contrôle sur des solutions de mélasse épurées et enrichies. Burgerstein Primärhefe est une source de très grande valeur de vitamines B et d'acides aminés importants.

Mode d'emploi
Prendre jusqu'à 6 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Remarque
Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé et fabriqué en Suisse.

Burgerstein Primärhefe, 200 comprimés

Burgerstein Spirulina

Comprimés à base d'algue Spirulina comme complément alimentaire

Indication nutritionnelle

	apport/j. (12 cpr.)
Valeur énergétique	97 kJ / 23 kcal
Protéines	3,8 g
Glucides	1,2 g
Lipides	0,3 g
Spirulina-poudre d'algue	6 g

Ingrédients

Spirulina-poudre d'algue à partir de culture biologique dynamique (Spirulina platensis).

Description

Burgerstein Spirulina est un distributeur naturel de nutriments pourvue d'une grande teneur en acides aminés et antioxydants naturels.

Mode d'emploi

Prendre 3 fois par jour 2-4 comprimés avec un peu de liquide.

Remarque

Conserver hors de la portée des enfants. L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Développé en Suisse, fabriqué en Inde.

Burgerstein Spirulina, 180 comprimés

Produits thérapeutiques

Les informations mentionnées au chapitre produits thérapeutiques correspondent aux notices d'emballage. Veuillez en outre tenir compte des informations suivantes sur les préparations des catégories de vente C et D:
Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien (ou de votre droguiste*). Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.
** seulement pour les préparations de la catégorie D*

Distributeur
Antistress SA, Société pour la protection de la santé, CH-8640 Rapperswil-Jona

Table des matières

Produits thérapeutiques

Préparations combinées	**133**
Burgerstein Geriatricum	134
Burgerstein Multivitamin	136
Burgerstein TopVital	138
Vitamines	**141**
Burgerstein Beta-Carotin 6 mg	142
Burgerstein Beta-Carotin 15 mg	144
Burgerstein Vitamin A	146
Burgerstein Vitamin B6 100 mg	148
Burgerstein Vitamin C retard	150
Burgerstein Vitamin E 100 I.E. / 400 I.E.	152
Sels minéraux/oligo-éléments	**155**
Burgerstein Magnesiumorotat	156
Burgerstein Zinkglukonat 8,5 mg / 30 mg	158
Burgerstein Zinktabletten 15 mg	160
Acides gras	**163**
Burgerstein EPA-capsules 500 mg	164
Burgerstein EPO Nachtkerzenöl	166
Produits divers	**169**
Burgerstein Lécithine	170

Table des matières

Produits thérapeutiques du canton d'Appenzell-Ausserrhoden

Préparations combinées	**173**
Burgerstein Anti-Ox/De-Tox	174
Burgerstein Multivitamin-Mineral ABC 25	176
Burgerstein Multivitamin-Mineral B75	178
Burgerstein Vitamin B-Komplex B50	180
Vitamines	**183**
Burgerstein Vitamin C 1000	184

Préparations combinées

Burgerstein Geriatricum

Qu'est-ce que le Burgerstein Geriatricum et quand doit-il être utilisé?
Burgerstein Geriatricum contient des vitamines, des substances minérales, des oligo-éléments ainsi que de l'extrait de ginseng pour favoriser l'amélioration du rendement physique et intellectuel après un affaiblissement de ces fonctions. Burgerstein Geriatricum convient en tant que fortifiant général pour les personnes âgées. C'est ainsi qu'il est approprié pendant la convalescence, lors de fatigue, d'atonie, d'épuisement, lors d'une alimentation déséquilibrée ou insuffisante, en cas de difficultés de mastication et de troubles d'assimilation de la nourriture.

Quand Burgerstein Geriatricum ne doit-il pas être utilisé?
En cas d'hypersensibilité à l'un des constituants, en présence d'un surdosage en vitamine(s) A et/ou D (hypervitaminose), si vous prenez d'autres médicaments contenant de la vitamine A ou D, si vous souffrez d'insuffisance rénale ou lorsque vous suivez un traitement à base de rétinoïdes (contre l'acné, p. ex.).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein Geriatricum?
Burgerstein Geriatricum ne doit pas être pris pendant une longue durée à une dose supérieure au dosage recommandé. En raison de sa teneur en acide p-aminobenzoïque, Burgerstein Geriatricum ne doit pas être pris en même temps que les sulfonamides. Remarque à l'intention des diabétiques: le ginseng peut diminuer les taux de glucose sanguin. Une interaction entre le ginseng et les anticoagulants, en particulier du type coumarinique ne peut pas être exclue. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein Geriatricum peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Vous pouvez prendre des vitamines, des minéraux ou des oligo-éléments pendant la grossesse et l'allaitement aux doses qui correspondent aux besoins journaliers. Aux doses journalières auxquelles Burgerstein Geriatricum vous est administré, vous ne devriez prendre Burgerstein Geriatricum qu'après avoir demandé conseil à votre médecin. Burgerstein Geriatricum contient entre autres de la vitamine A. Il faut tenir compte du fait qu'une alimentation équilibrée couvre les besoins quotidiens en vitamine A (le foie, les produits à base de foie, le lait, les produits laitiers, la margarine, les œufs et les huiles comestibles en contiennent). Parfois même, les besoins journaliers sont dépassés (surtout lors de consommation de foie, éventuellement de produits à base de foie). Il a été constaté que le risque de certaines malformations chez les nouveau-nés augmentait avec la prise quotidienne de hautes doses de vitamine A pendant la grossesse. C'est pourquoi, lors de la consommation d'une grande quantité d'aliments contenant de la vitamine A, la prise simultanée de Burgerstein Geriatricum doit être évitée. Lors de la consommation de foie, Burgerstein Geriatricum ne doit pas être utilisé.

Comment utiliser Burgerstein Geriatricum?
Adultes: Chaque jour une capsule après un repas principal. En gardant la capsule pendant quelques secondes dans la bouche avec un peu de liquide, vous pouvez l'avaler facilement. Le dosage peut être augmenté à deux capsules par jour. Il est recommandé de prendre Burgerstein Geriatricum pendant quelques mois. Burgerstein Geriatricum n'est pas indiqué chez les enfants et les adolescents. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?
Burgerstein Geriatricum doit être conservé hors de la portée des enfants, dans un emballage bien fermé, au sec et à température ambiante (15-25°C). Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Burgerstein Geriatricum?
1 capsule contient:

vitamine A	4000 UI
vitamine D3	400 UI
vitamine E	50 UI
vitamine B1	3 mg
vitamine B2	3 mg
vitamine B6	10 mg
vitamine B12	12 µg
pantothénate de calcium	16,31 mg
acide folique	0,4 mg
nicotinamide	15 mg
vitamine C (ascorbate de calcium)	100 mg
choline	40 mg
biotine	0,3 mg
acide paraaminobenzoïque	15 mg
inositol	40 mg
extrait de ginseng avec 3,4 mg de ginsénosides	100 mg
facteur intrinsèque	12 µg
molybdène	100 µg
cuivre	1 mg
manganèse	3 mg
zinc	8 mg
magnésium	35 mg
fer	5 mg
sélénium	50 µg
calcium	70 mg
phosphore	25 mg

Excipients:
éthylvanilline, excip. par caps.

Où obtenez-vous Burgerstein Geriatricum? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
En emballage de 40 et 100 capsules.

Numéro d'autorisation: 53121 (Swissmedic). Catégorie de vente: D.

Burgerstein Multivitamin

Multivitamines

Qu'est-ce que le Burgerstein Multivitamin et quand doit-il être utilisé?
Dans les périodes où les besoins augmentent, Burgerstein Multivitamin assure un apport suffisant en vitamines, minéraux et oligo-éléments. Il contient, en plus, de l'huile de chardon ainsi que des bioflavonoïdes qui sont importants pour stabiliser les capillaires sanguins. On utilise Burgerstein Multivitamin dans les périodes d'effort ou d'épuisement physique et intellectuel, pendant la convalescence, la croissance ainsi que lors d'un apport insuffisant en vitamines, minéraux et oligo-éléments (alimentation non équilibrée, régimes amaigrissants).

Quand Burgerstein Multivitamin ne doit-il pas être utilisé?
Vous ne devez pas prendre Burgerstein Multivitamin si vous êtes allergique à l'un des composants, en cas de surdosage de vitamine A ou D (dit hypervitaminose), si vous prenez d'autres médicaments qui contiennent de la vitamine A ou D, si vous souffrez d'une insuffisance rénale ou si vous êtes traité par des rétinoïdes (p. ex. contre l'acné). Burgerstein Multivitamin n'est pas indiqué chez les enfants et les adolescents.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein Multivitamin?
Ne pas dépasser la dose recommandée sur une longue période de temps. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein Multivitamin peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Burgerstein Multivitamin contient entre autres de la vitamine A. Si vous êtes enceinte ou si vous pouvez le devenir, vous ne devez prendre Burgerstein Multivitamin qu'après avoir demandé l'avis du médecin. La dose prescrite par le médecin ne doit pas être dépassée, car un surcroît de vitamine A, en particulier au début de la grossesse, peut nuire à la formation de l'enfant. Lors de la consommation d'une grande quantité d'aliments contenant de la vitamine A, la prise simultanée de Burgerstein Multivitamin doit être évitée. Lors de la consommation de foie, on doit renoncer à prendre Burgerstein Multivitamin. En cas de doute, veuillez demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Burgerstein Multivitamin?
Adultes: Sauf avis contraire, prendre 1 capsule tous les jours au petit déjeuner. Gardez la capsule en bouche pendant quelques secondes avec un peu de liquide et elle sera plus facile à avaler. La posologie peut être portée à 2 capsules par jour en cas de besoin. L'utilisation et la sécurité de Burgerstein Multivitamin n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Burgerstein Multivitamin peut-il provoquer?
La prise de Burgerstein Multivitamin peut provoquer dans des rares cas des réactions allergiques. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?
Il est important d'avoir une alimentation variée. Choisissez de préférence des produits frais, si possible non traités. Evitez les aliments qui contiennent de la farine et du sucre raffinés, des additifs chimiques, faites attention aux graisses cachées et prenez de l'exercice tous les jours. Burgerstein Multivitamin doit être conservé hors de la portée des enfants, dans un emballage bien fermé, au sec et à une température ambiante (15-25°C). Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Burgerstein Multivitamin?
Chaque capsule contient:

vitamine A	4000 UI
vitamine D3	400 UI
vitamine E	50 UI
vitamine B1	5 mg
vitamine B2	2 mg
vitamine B6	2 mg
vitamine B12	4 µg
nicotinamide	20 mg
acide folique	0,4 mg
pantothénate de calcium	20 mg
biotine	0,3 mg
vitamine C	80 mg
acide para-aminobenzoïque	10 mg
bitartrate de choline	80 mg
complexe de bioflavonoïdes	80 mg
huile de carthame	200 mg
complexe d'hespéridine	6 mg
rutoside	8 mg
L-lysine	10 mg
papaïne	2 mg
gluconate de cuivre	1 mg
gluconate de manganèse	1 mg
gluconate de zinc	15 mg
oxyde de magnésium	50 mg
fumarate de fer	30 mg
hydrogénophosphate de calcium	238 mg
inositol	80 mg
éthylvanilline	

Où obtenez-vous Burgerstein Multivitamin?
Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
En emballages de 60 capsules.

Numéro d'autorisation: 38382 (Swissmedic). Catégorie de vente: D.

Burgerstein TopVital

Qu'est-ce que le Burgerstein TopVital et quand doit-il être utilisé?
Burgerstein TopVital contient des vitamines, des substances minérales, des oligo-éléments ainsi que de l'extrait de ginseng, pour favoriser l'amélioration du rendement physique et intellectuel après un affaiblissement de ces fonctions. Burgerstein TopVital convient en tant que fortifiant général pour les personnes âgées. C'est ainsi qu'il est approprié pendant la convalescence, lors de fatigue, d'atonie, d'épuisement, lors d'une alimentation déséquilibrée ou insuffisante, en cas de difficultés de mastication et de troubles d'assimilation de la nourriture.

Quand Burgerstein TopVital ne doit-il pas être utilisé?
En cas d'hypersensibilité à l'un des constituants, en présence d'un surdosage en vitamine(s) A et/ou D (hypervitaminose), si vous prenez d'autres médicaments contenant de la vitamine A ou D, si vous souffrez d'insuffisance rénale ou lorsque vous suivez un traitement à base de rétinoïdes (contre l'acné, p. ex.).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein TopVital?
Burgerstein TopVital ne doit pas être pris pendant une longue durée à une dose supérieure au dosage recommandé. En raison de sa teneur en acide p-aminobenzoïque, Burgerstein TopVital ne doit pas être pris en même temps que les sulfonamides. Remarque à l'intention des diabétiques: le ginseng peut diminuer les taux de glucose sanguin. Une interaction entre le ginseng et les anticoagulants en particulier du type coumarinique ne peut pas être exclue. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein TopVital peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Vous pouvez prendre des vitamines, des minéraux ou des oligo-éléments pendant la grossesse et l'allaitement aux doses qui correspondent aux besoins journaliers. Aux doses journalières auxquelles Burgerstein TopVital vous est administré, vous ne devriez prendre Burgerstein TopVital qu'après avoir demandé conseil à votre médecin. Burgerstein TopVital contient entre autres de la vitamine A. Il faut tenir compte du fait qu'une alimentation équilibrée couvre les besoins quotidiens en vitamine A (le foie, les produits à base de foie, le lait, les produits laitiers, la margarine, les œufs et les huiles comestibles en contiennent). Parfois même, les besoins journaliers sont dépassés (surtout lors de consommation de foie, éventuellement de produit à base de foie). Il a été constaté que le risque de certaines malformations chez les nouveau-nés augmentait avec la prise quotidienne de hautes doses de vitamine A pendant la grossesse. C'est pourquoi, lors de la consommation d'une grande quantité d'aliments contenant de la vitamine A, la prise simultanée de Burgerstein TopVital doit être évitée. Lors de la consommation de foie, Burgerstein TopVital ne doit pas être utilisé.

Comment utiliser Burgerstein TopVital?
Adultes: Chaque jour une capsule après un repas principal. En gardant la capsule pendant quelques secondes dans la bouche avec un peu de liquide, vous pouvez l'avaler facilement. Le dosage peut être augmenté à deux capsules par jour. Il est recommandé de prendre Burgerstein TopVital pendant quelques mois. Burgerstein TopVital n'est pas indiqué chez les enfants et les adolescents. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Burgerstein TopVital peut-il provoquer?
La prise de Burgerstein TopVital peut provoquer dans de rares cas nausées et vomissements. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?
Burgerstein TopVital doit être conservé hors de la portée des enfants, dans un emballage bien fermé, au sec et à température ambiante (15-25°C). Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Burgerstein TopVital?
1 capsule contient:

mine A	4000 UI
vitamine D3	400 UI
vitamine E	50 UI
vitamine B1	3 mg
vitamine B2	3 mg
vitamine B6	10 mg
vitamine B12	12 µg
pantothénate de calcium	16,31 mg
acide folique	0,4 mg
nicotinamide	15 mg
vitamine C (ascorbate de calcium)	100 mg
choline	40 mg
biotine	0,3 mg
acide paraaminobenzoïque	15 mg
inositol	40 mg
extrait de ginseng	100 mg
avec 3,4 mg des ginsénosides	
facteur intrinsèque	12 µg
molybdène	100 µg
cuivre	1 mg
manganèse	3 mg
zinc	8 mg
magnésium	35 mg
fer	5 mg
sélénium	50 µg
calcium	70 mg
phosphore	25 mg

Excipients:
éthylvanilline, excip. par caps.

Où obtenez-vous Burgerstein TopVital?
Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
En emballages de 40 et 100 capsules.

Numéro d'autorisation: 55701 (Swissmedic). Catégorie de vente: D.

Vitamines

Burgerstein Beta-Carotin 6 mg

Bêta-carotène 6 mg

Qu'est-ce que le Burgerstein Beta-Carotin 6 mg et quand doit-il être utilisé?
Burgerstein Beta-Carotin 6 mg est extrait d'algues marines australiennes par un procédé spécial. Le bêta-carotène est un précurseur de la vitamine A. C'est une substance nutritive à effet antioxydant exerçant une fonction protectrice et donc un important complément alimentaire.

Quand Burgerstein Beta-Carotin 6 mg ne doit-il pas être utilisé?
À ne pas prendre avec d'autres préparations contenant de la vitamine A. Ces capsules sont également contre-indiquées en cas d'un apport excessif en vitamine A, lors de graves affections rénales, en cas d'hypersensibilité au principe actif et pendant un traitement aux rétinoïdes (p.ex. pour combattre l'acné).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein Beta-Carotin 6 mg?
Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein Beta-Carotin 6 mg peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Pendant une grossesse ou l'allaitement, consulter un médecin avant de prendre Burgerstein Beta-Carotin 6 mg.

Comment utiliser Burgerstein Beta-Carotin 6 mg?
Adultes: En général, prendre après un repas 1 capsule à 6 mg avec un peu de liquide, comme complément en bêta-carotène de l'alimentation quotidienne. L'utilisation et la sécurité de Burgerstein Beta-Carotin 6 mg n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Burgerstein Beta-Carotin 6 mg peut-il provoquer?
Aucun effet secondaire de Burgerstein Beta-Carotin 6 mg n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Une prise prolongée et à haute dose de la préparation peut se manifester par une coloration jaune de la peau, notamment aux mains, aux pieds et au visage. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?
Burgerstein Beta-Carotin 6 mg doit être conservé hors de la portée des enfants, dans l'emballage bien fermé, au sec et à température ambiante (15-25°C). Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Burgerstein Beta-Carotin 6 mg?
Chaque capsule contient 6 mg de bêta-carotène.

Où obtenez-vous Burgerstein Beta-Carotin 6 mg?
Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
Emballages de 100 capsules.

Numéro d'autorisation: 51274 (Swissmedic). Catégorie de vente: D.

Burgerstein Beta-Carotin 15 mg

Bêta-carotène 15 mg

Information destinée aux patients
Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez la notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que le Burgerstein Beta-Carotin 15 mg et quand doit-il être utilisé?
Selon prescription du médecin. Burgerstein Beta-Carotin 15 mg est extrait d'algues marines australiennes. Le bêta-carotène est le précurseur naturel de la vitamine A. C'est dans le foie qu'il est transformé en vitamine A. La vitamine A est essentielle pour la croissance et le développement de l'organisme, pour la fonction visuelle, pour la reproduction, pour les défenses naturelles ainsi que pour l'entretien des fonctions protectrices de la peau et des muqueuses (système digestif, voies respiratoires, appareil urogénital).

Quand Burgerstein Beta-Carotin 15 mg ne doit-il pas être utilisé?
Cette préparation est contre-indiquée en cas d'apport excessif en vitamine A, lorsque l'on prend d'autres médicaments contenant de la vitamine A, de même que lors de graves troubles de la fonction rénale et pendant un traitement aux rétinoïdes (p.ex. contre l'acné), ou une hypersensibilité à l'un des composants.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein Beta-Carotin 15 mg?
Cesser de prendre ces capsules à l'apparition soudaine d'effets désagréables, et aller voir un médecin. Les patients souffrant de troubles chroniques de la fonction rénale devront se montrer particulièrement prudents. Dans deux études scientifiques, on a constaté que des fumeurs de longue date qui avaient pris une dose journalière supérieure à 20 mg de bêta-carotène durant plusieurs années ont vu leur risque de cancer du poumon ou de maladies cardio-vasculaires augmenté. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein Beta-Carotin 15 mg peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Aucune étude contrôlée n'a été effectuée avec bêta-carotène chez la femme enceinte. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Burgerstein Beta-Carotin 15 mg?
On prend normalement 2-3 capsules par jour après un repas principal, avec un peu de liquide. Votre médecin décidera de la posologie qui vous convient. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte. L'utilisation et la sécurité de Burgerstein Beta-Carotin 15 mg n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

Quels effets secondaires Burgerstein Beta-Carotin 15 mg peut-il provoquer?
Un apport excessif en vitamine A se traduit par les symptômes suivants: maux de tête, lassitude, vertiges, indolence, irritabilité excessive, troubles de sommeil, manque d'appétit, malaises, vomissements, diplopie; symptômes cutanés: desquamation, démangeaisons, perte de cheveux, coins de la bouche fendus. A l'apparition de ces symptômes, il faudra cesser de prendre ces capsules et aller voir un médecin. Des doses élevées prises pendant une période prolongée peuvent entraîner une coloration jaune de la peau, notamment aux mains, aux pieds et au visage. Si vous remarquez des effets secondaires, qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?
Burgerstein Beta-Carotin 15 mg doit être conservé hors de la portée des enfants, dans l'emballage bien fermé, au sec et à température ambiante (15-25°C). Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Burgerstein Beta-Carotin 15 mg?
Chaque capsule contient 15 mg de bêta-carotène obtenu à partir de l'algue de mer.

Où obtenez-vous Burgerstein Beta-Carotin 15 mg?
Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacies, sur ordonnance médicale.
Emballages de 100 capsules.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2011 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Numéro d'autorisation: 50096 (Swissmedic). Catégorie de vente: B.

Burgerstein Vitamin A

Vitamine A

Information destinée aux patients
Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez la notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que le Burgerstein Vitamin A et quand doit-il être utilisé?
Il est utilisé sur prescription du médecin. La vitamine A est indispensable aux processus de la vision et à une fonction normale de la peau et des muqueuses. Les signes détectables les plus précoces d'une carence en vitamine A sont une mauvaise vision crépusculaire et une cécité nocturne. Burgerstein Vitamin A est recommandé sur ordonnance médicale *pour supprimer une carence en vitamine A*. Il est indiqué de ce fait dans le traitement de maladies oculaires, telles que la cécité nocturne, la sécheresse de la conjonctive et de la cornée ainsi que la kératomalacie (inflammation profonde de la cornée), dans le traitement de maladies squameuses de la peau (hyperkératoses, ichthyose), lors de troubles de l'absorption des graisses ou d'une carence alimentaire. En outre, Burgerstein Vitamin A est prescrit par le médecin comme adjuvant dans le traitement local de l'acné.

Quand Burgerstein Vitamin A ne doit-il pas être utilisé?
Burgerstein Vitamin A ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue (allergie) aux arachides. Burgerstein Vitamin A ne doit pas être utilisé si la vitamine A est en quantité excessive dans l'organisme (hypervitaminose A), en cas de troubles fonctionnels rénaux sévères et lors d'une thérapie par des rétinoïdes (p. ex. dans l'acné).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein Vitamin A?
La prudence est de mise en présence de troubles fonctionnels des reins, d'une cirrhose du foie et en période de croissance. Il faut éviter la prise simultanée de préparations contenant de la vitamine A. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein Vitamin A peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment utiliser Burgerstein Vitamin A?
C'est le médecin qui détermine pour vous le dosage approprié. Les quantités usuelles à prendre pour les adultes sont les suivantes:

Supplémentation
En cas de signes de carence en vitamine A, prendre jusqu'à disparition des symptômes 1-2 capsules par jour après les repas.

Utilisation thérapeutique
Pour l'utilisation thérapeutique, telle que le soutien d'un traitement local de l'acné, il est recommandé de prendre 2 capsules 2-4 fois par jour (100'000-200'000 UI) durant ou après les repas.
Enfants (à partir de 25 kg): 2 capsules par jour (= 50'000 UI/jour).
La dose maximale quotidienne pour les enfants est de 4'000 UI par kg de poids.
Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Burgerstein Vitamin A peut-il provoquer?
Les effets secondaires suivants qui peuvent survenir en cas de prise de Burgerstein Vitamin A correspondent à un surdosage en vitamine A, à l'origine de ces troubles. Si vous ressentez une sensation de vertiges, si vous avez des maux de tête, si vous devez vomir ou si vous êtes anormalement fatigué, vous pouvez imputer ces signes à une trop grande quantité de vitamine A dans votre organisme. D'autres signes, tels que des modifications de la peau (squames, démangeaisons, muqueuses sèches, inflammations des lèvres) et des douleurs osseuses doivent également attirer votre attention. Dans ces cas, vous devriez en parler à votre médecin qui décidera alors si vous devez continuer à prendre Burgerstein Vitamin A. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il faire encore attention?
Burgerstein Vitamin A doit être conservé hors de la portée des enfants, dans l'emballage bien fermé, à température ambiante (15-25°C). Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Burgerstein Vitamin A?
25'000 UI de palmitate de vitamine A par capsule.



Où obtenez-vous Burgerstein Vitamin A? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Emballages de 100 capsules.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2004 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Numéro d'autorisation: 44694 (Swissmedic). Catégorie de vente: B.

Burgerstein Vitamin B6 100 mg

Vitamine B6 100 mg

Qu'est-ce que le Burgerstein Vitamin B6 100 mg et quand doit-il être utilisé?
La vitamine B6 est une substance vitale qui doit être fournie à l'organisme par l'alimentation. Burgerstein Vitamin B6 100 mg est indiqué en cas de carence en vitamine B6 qui peut apparaître lors de besoins augmentés par la prise régulière de la pilule contraceptive ou de remèdes tels que certains produits antituberculeux et pénicillamines qui affaiblissent l'action de la vitamine B6. Une carence en vitamine B6 peut entraîner des modifications de la peau et des muqueuses et dans les cas graves, on peut également observer une anémie et des spasmes cérébraux.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?
Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Burgerstein Vitamin B6 100 mg peut être pris en même temps que ces médicaments.

Quand Burgerstein Vitamin B6 100 mg ne doit-il pas être utilisé?
Ce remède est contre-indiqué chez les patients ayant une hypersensibilité connue à la vitamine B6 ainsi que chez les personnes souffrant de la maladie de Parkinson et traités par la L-dopa.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein Vitamin B6 100 mg?
La vitamine B6 peut diminuer l'effet anticonvulsivant de remèdes utilisés en cas d'épilepsie (barbituriques, phénytoïne) et l'action de la L-dopa utilisée chez les parkinsoniens. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein Vitamin B6 100 mg peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Burgerstein Vitamin B6 100 mg?
Adultes: Sauf prescription contraire du médecin, prendre 1 comprimé de Burgerstein Vitamin B6 100 mg, sans le croquer, avec du liquide. L'utilisation et la sécurité de Burgerstein Vitamin B6 100 mg n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quels effets secondaires Burgerstein Vitamin B6 100 mg peut-il provoquer?
Les effets secondaires suivants peuvent se manifester lors de la prise de Burgerstein Vitamin B6 100 mg:
Lors de la prise quotidienne de plus de 500 mg de vitamine B6 durant plusieurs semaines à plusieurs mois, des troubles des fonctions nerveuses ou de la coordination motrice peuvent être observés. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?
Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Le médicament doit être conservé hors de la portée des enfants à température ambiante de 15-25°C. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Burgerstein Vitamin B6 100 mg?
1 comprimé de Burgerstein Vitamin B6 100 mg contient 100 mg de vitamine B6.

Où obtenez-vous Burgerstein Vitamin B6 100 mg?
Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie sans ordonnance médicale.
Emballages de 100 comprimés.

Numéro d'autorisation: 47054 (Swissmedic). Catégorie de vente: C.

Burgerstein Vitamin C retard

Vitamine C

Qu'est-ce que le Burgerstein Vitamin C retard et quand doit-il être utilisé?
Burgerstein Vitamin C retard contient comme principe actif de la vitamine C pure (acide ascorbique). La vitamine C intervient par le biais de divers mécanismes dans un grand nombre de processus métaboliques de nécessité vitale. Burgerstein Vitamin C retard est administré pour traiter et prévenir des états carentiels en vitamine C. La formule en pellets dans Burgerstein Vitamin C retard assure une libération continue et égale de vitamine C durant 8 à 24 heures. On ne sait pas encore à ce jour si ce procédé joue un rôle sur l'action. Ces capsules sont instaurées pour traiter et prévenir des états carentiels en vitamine C, tels que le scorbut et ses phases préliminaires. Dans les maladies ou dans les conditions suivantes, les besoins en vitamine C peuvent être augmentés et/ou exiger une administration complémentaire:

- saignements des gencives (gingivorragies) lors de déficit en vitamine C;
- guérison d'une plaie, par exemple après une extraction dentaire;
- opérations;
- maladies infectieuses;
- maladies dues au refroidissement;
- troubles de l'absorption après l'ablation de l'estomac (gastrectomie) ou après des affections gastro-intestinales;
- tabagisme;
- grossesse et allaitement;
- traitement par des antibiotiques;
- épuration sanguine (dialyse).

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?
Etant donné que l'organisme humain ne peut pas synthétiser la vitamine C, il est nécessaire de la fournir avec l'alimentation. Les légumes et les fruits sont riches en vitamine C, notamment les agrumes tels que les oranges, les citrons et les pamplemousses. De grandes quantités de vitamine C se trouvent également dans le foie et les reins, mais pas dans la viande, les céréales et les produits laitiers. Le fait de cuire, de laver à grande eau, de tenir au chaud et de conserver (même dans le congélateur) les aliments peut diminuer de manière importante leur teneur en vitamine C.
1 capsule contient 65,2 mg de glucides. Cette quantité correspond à 1,12 kJ (=0,27 kcal) ou 0,0054 unité pain. Burgerstein Vitamin C retard convient donc aux diabétiques. Les diabétiques qui testent eux-mêmes le sucre urinaire devraient renoncer à prendre les capsules de Burgerstein Vitamin C retard quelques jours avant le test, car la vitamine C influe sur le résultat.

Quand Burgerstein Vitamin C retard ne doit-il pas être utilisé?
Vous devriez arrêter de prendre Burgerstein Vitamin C retard si vous présentez des réactions allergiques à l'un des composants du produit. Si vous souffrez de calculs rénaux avec excrétion simultanée d'acide oxalique, d'une maladie de stockage du fer ou de l'urémie, il est déconseillé de prendre Burgerstein Vitamin C retard.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein Vitamin C retard?
Les patients souffrant de calculs rénaux ne doivent prendre plus de 500 mg de vitamine C par jour qu'avec l'accord du médecin. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein Vitamin C retard peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Il n'existe aucun indice des risques encourus lors de la prise de vitamine C durant la grossesse ou l'allaitement.

Comment utiliser Burgerstein Vitamin C retard?
Sauf avis contraire du médecin: adultes et adolescents de plus de 12 ans: la posologie recommandée en cas d'états carentiels est de 1 à 2 capsules par jour et lors de maladies dues au refroidissement, la dose journalière est de 2 capsules. Burgerstein Vitamin C retard n'est pas indiqué chez les enfants de moins de 12 ans. Les capsules doivent être avalées sans être croquées avec beaucoup d'eau ou de jus. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Burgerstein Vitamin C retard peut-il provoquer?
Les effets secondaires suivants peuvent se manifester lors de la prise de Burgerstein Vitamin C retard: des doses très élevées (4-5 g et plus) peuvent occasionnellement provoquer une diarrhée légère ou une élimination d'urine plus fréquente. La formation de calculs rénaux à la suite de la prise de doses élevées de vitamine C durant une longue période n'est pas à craindre selon les dernières données. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il faire encore attention?
Ce médicament doit être conservé à température ambiante (15-25°C) et hors de la portée des enfants. Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Burgerstein Vitamin C retard?
1 capsule avec libération retardée du principe actif contient:
Principe actif: Vitamine C 500 mg.
Excipients: Excip. par caps. ret.

Où obtenez-vous Burgerstein Vitamin C retard?
Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
En emballages de 30 et 100 capsules.

Numéro d'autorisation: 44259 (Swissmedic). Catégorie de vente: D.

Burgerstein Vitamin E 100 I.E. / 400 I.E.

Vitamine E 100 UI / 400 UI

Qu'est-ce que le Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et le Burgerstein Vitamin E 400 I.E. et quand doivent-ils être utilisés?
Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et Burgerstein Vitamin E 400 I.E. contiennent de la vitamine E naturelle extraite d'huiles végétales. La vitamine E est une substance indispensable à la vie. Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et Burgerstein Vitamin E 400 I.E. sont utilisés pour couvrir un besoin accru en vitamine E (par exemple lors de régimes alimentaires contenant beaucoup d'acides gras polyinsaturés). Cette préparation peut être utilisée pour prévenir et traiter une carence en vitamine E consécutive à une alimentation insuffisante ou à des troubles de l'assimilation et peut être essayée en cas de troubles du métabolisme des graisses.

Quand Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et Burgerstein Vitamin E 400 I.E. ne doivent-ils pas être utilisés?
Si vous êtes allergique à l'un des composants.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et de Burgerstein Vitamin E 400 I.E.?
Les patients qui reçoivent des anticoagulants ne doivent prendre Burgerstein Vitamin E 100 I.E. ou Burgerstein Vitamin E 400 I.E. qu'après avoir demandé conseil à leur médecin. L'administration simultanée de préparations à base de fer peut diminuer l'action de Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et Burgerstein Vitamin E 400 I.E. C'est pourquoi un intervalle d'environ 4 heures doit être observé entre la prise des préparations de fer et celle des capsules de vitamine E. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et Burgerstein Vitamin E 400 I.E. peuvent-ils être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Aux doses correspondantes au besoin, il est permis de prendre la vitamine E pendant la grossesse et l'allaitement. A des doses telles que celles de Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et de Burgerstein Vitamin E 400 I.E. vous ne devriez cependant prendre ce médicament qu'après avoir consulté votre médecin.

Comment utiliser Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et Burgerstein Vitamin E 400 I.E.?
Adultes:
Burgerstein Vitamin E 100 I.E.:
Prendre une capsule 1 à 4 fois par jour pendant les repas, avec un verre d'eau.
Burgerstein Vitamin E 400 I.E.:
Sauf avis contraire du médecin, prenez chaque jour 1 capsule au cours d'un repas, avec un verre d'eau.
L'utilisation et la sécurité d'emploi de Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et de Burgerstein Vitamin E 400 I.E. n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents. C'est pourquoi ces personnes ne devraient pas utiliser ce médicament. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et Burgerstein Vitamin E 400 I.E. peuvent-ils provoquer?
Ce n'est qu'à partir de doses de l'ordre du gramme que des troubles gastro-intestinaux passagers peuvent se manifester (ballonnement, diarrhée ou nausées). Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?
Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et Burgerstein Vitamin E 400 I.E. doivent être conservés hors de la portée des enfants, dans l'emballage bien fermé, au sec et à température ambiante (15-25°C). Ces médicaments ne doivent pas être utilisés au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contiennent Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et Burgerstein Vitamin E 400 I.E.?
Burgerstein Vitamin E 100 I.E.:
Chaque capsule contient 100 UI de vitamine E naturelle et des adjuvants.
Burgerstein Vitamin E 400 I.E.:
Chaque capsule contient 400 UI de vitamine E naturelle et des adjuvants.

Où obtenez-vous Burgerstein Vitamin E 100 I.E. et Burgerstein Vitamin E 400 I.E.? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
Burgerstein Vitamin E 100 I.E.:
Flacons à 100 capsules.
Burgerstein Vitamin E 400 I.E.:
Flacons à 30 et à 100 capsules.

Numéro d'autorisation: 38407, 44562 (Swissmedic). Catégorie de vente: D.

Sels minéraux / oligo-éléments

Burgerstein Magnesiumorotat

Orotate de magnésium

Qu'est-ce que le Burgerstein Magnesiumorotat et quand doit-il être utilisé?
Burgerstein Magnesiumorotat est une spécialité d'un sel minéral organique, utilisée comme tranquillisant général.

Quand Burgerstein Magnesiumorotat ne doit-il pas être pris?
En cas d'hypersensibilité à un des composants, en cas de troubles fonctionnels rénaux sévères, en cas de carence liquidienne corporelle et lors d'une prédisposition aux infections des voies urinaires avec formation de calculs de magnésium, ammonium et phosphates.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein Magnesiumorotat?
En cas d'une fonction rénale modérément réduite, vous ne devez prendre le médicament qu'après avoir consulté votre médecin. Burgerstein Magnesiumorotat ne doit pas être pris en même temps que certains antibiotiques (tétracyclines, inhibiteurs de la gyrase) ou des sels ferreux. On peut retarder la prise d'un laps de temps de 3 heures. Si Burgerstein Magnesiumorotat est pris avec de la vitamine D3, il peut provoquer une élévation des taux de calcémie. Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à conduire et la capacité à utiliser des outils ou des machines! Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein Magnesiumorotat peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Burgerstein Magnesiumorotat?
Adultes: prendre 1-3 comprimés par jour ou suivre la prescription du médecin. L'utilisation et la sécurité de Burgerstein Magnesiumorotat n'ont pas été établies à ce jour pour les enfant et les adolescents. Pour cette raison, l'utilisation du produit est contre-indiquée pour eux. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Burgerstein Magnesiumorotat peut-il provoquer?
Les effets secondaires suivants peuvent se manifester lors de la prise de Burgerstein Magnesiumorotat: selles molles ou diarrhée. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?
Burgerstein Magnesiumorotat doit être conservé hors de la portée des enfants, dans l'emballage bien fermé et à température ambiante (15-25°C). Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Burgerstein Magnesiumorotat?
Chaque comprimé contient 400 mg d'orotate de magnésium (correspondant à 25 mg de magnésium élémentaire).

Où obtenez-vous Burgerstein Magnesiumorotat?
Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
En emballages de 120 comprimés.

Numéro d'autorisation: 47049 (Swissmedic). Catégorie de vente: D.

Burgerstein Zinkglukonat 8,5 mg / 30 mg

Gluconate de zinc 8,5 mg / 30 mg

Information destinée aux patients
Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez la notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que le Burgerstein Zinkglukonat et quand doit-il être utilisé?
Selon prescription du médecin. Le zinc est un oligo-élément vital important pour l'organisme humain. Lors d'une carence en zinc, on peut observer les symptômes suivants: affections cutanées squameuses, chute des cheveux, retard de cicatrisation des plaies (p.ex. chez les diabétiques), troubles des sens gustatifs et olfactifs, opacités de la cornée, prédisposition aux infections, apathie, baisse de la fonction des organes génitaux (testicules, ovaires), retard de développement corporel. Un déficit en zinc peut survenir en raison d'une alimentation déséquilibrée ou insuffisante ou lorsque les besoins en zinc sont augmentés, comme par exemple après des opérations, des blessures, des brûlures, une grossesse et l'allaitement. Des pertes accrues de zinc, pouvant être causées par certains remèdes ou par une résorption insuffisante (p.ex. lors de maladies intestinales, de cirrhose du foie) peuvent entraîner une carence en zinc.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?
Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien pour savoir si vous pouvez prendre simultanément Burgerstein Zinkglukonat.

Quand Burgerstein Zinkglukonat ne doit-il pas être utilisé?
Burgerstein Zinkglukonat est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients, lors de troubles fonctionnels rénaux sévères ou de décompensation rénale aiguë.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein Zinkglukonat?
L'apport de zinc peut entraver l'assimilation d'autres oligo-éléments. On peut observer une diminution de l'absorption du cuivre, une cuprémie faible ainsi que des troubles de l'absorption du fer. Le zinc peut également perturber l'absorption d'un groupe bien défini d'antibiotiques (tétracyclines). Pour cette raison, ces antibiotiques ne doivent être pris qu'avant ou au minimum 5 heures après la prise de Burgerstein Zinkglukonat. L'absorption du zinc étant diminuée par des produits contenant du calcium ou du phosphore, ainsi que par le café et les produits à base de farine complète, il est recommandé de prendre Burgerstein Zinkglukonat soit 1 heure avant, soit 2 heures après les repas. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein Zinkglukonat peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Burgerstein Zinkglukonat peut être pris durant la grossesse ou la période d'allaitement aux doses prescrites par le médecin.

Comment utiliser Burgerstein Zinkglukonat?
Adultes: C'est le médecin qui fixera pour vous la posologie appropriée en fonction de votre bilan métabolique. Les comprimés sont pris non croqués avec du liquide, 1 heure *avant* ou 2 heures *après* les repas. Burgerstein Zinkglukonat n'est pas indiqué chez les enfants et les adolescents. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Burgerstein Zinkglukonat peut-il provoquer?
La prise de Burgerstein Zinkglukonat peut provoquer les effets secondaires suivants: dans de rares cas pyrosis, vomissements, diarrhée ou nausées légères. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il faire encore attention?
Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Burgerstein Zinkglukonat doit être conservé hors de la portée des enfants, dans l'emballage bien fermé, au sec et à la température ambiante (15-25°C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Burgerstein Zinkglukonat?
Le gluconate de zinc est un composé organique de zinc. Burgerstein Zinkglukonat est disponible aux dosages de 8,5 mg et 30 mg de zinc par comprimé.

Où obtenez-vous Burgerstein Zinkglukonat 8,5 et 30 mg?
Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Emballages: 100 comprimés à 8,5 mg et 100 comprimés à 30 mg.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2007 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Numéro d'autorisation: 47133 (Swissmedic). Catégorie de vente: B.

Burgerstein Zinktabletten 15 mg

Comprimés de zinc 15 mg

Information destinée aux patients
Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez la notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que le Burgerstein Zinktabletten 15 mg et quand doit-il être utilisé?
Selon prescription du médecin. Le zinc est un oligo-élément vital important pour l'organisme humain. Lors d'une carence en zinc, on peut observer les symptômes suivants: affections cutanées squameuses, chute des cheveux, retard de cicatrisation des plaies (p.ex. chez les diabétiques), troubles des sens gustatif et olfactif, opacités de la cornée, prédisposition aux infections, apathie, baisse de la fonction des organes génitaux (testicules, ovaires), retard de développement corporel. Un déficit en zinc peut survenir en raison d'une alimentation déséquilibrée ou insuffisante ou lorsque les besoins en zinc sont augmentés, comme par exemple après des opérations, des blessures, des brûlures, une grossesse et l'allaitement. Des pertes accrues de zinc, pouvant être causées par certains remèdes ou par une résorption insuffisante (p.ex. lors des maladies intestinales, de cirrhose du foie), peuvent entraîner une carence en zinc.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?
Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien pour savoir si vous pouvez prendre simultanément Burgerstein Zinktabletten 15 mg.

Quand Burgerstein Zinktabletten 15 mg ne doit-il pas être utilisé?
Burgerstein Zinktabletten 15 mg est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à l'un des composants ainsi qu'en cas de troubles fonctionnels rénaux sévères ou de décompensation rénale aiguë.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein Zinktabletten 15 mg?
L'apport de zinc peut entraver l'assimilation d'autres oligo-éléments. On peut observer une diminution de l'absorption du cuivre, une cuprémie faible ainsi que des troubles de l'absorption du fer. Le zinc peut également perturber l'absorption d'un groupe bien défini d'antibiotiques (tétracyclines). Pour cette raison, ces antibiotiques ne doivent être pris qu'avant ou au minimum 5 heures après la prise de Burgerstein Zinktabletten 15 mg. L'absorption du zinc étant diminuée par des produits contenant du calcium ou du phosphore, ainsi que par le café et les produits à base de farine complète, il est recommandé de prendre Burgerstein Zinktabletten 15 mg soit 1 heure avant, soit 2 heures après les repas. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein Zinktabletten 15 mg peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Burgerstein Zinktabletten 15 mg peut être pris durant la grossesse ou la période d'allaitement aux doses prescrites par le médecin.

Comment utiliser Burgerstein Zinktabletten 15 mg?
Adultes: C'est le médecin qui fixera pour vous la posologie appropriée en fonction de votre bilan métabolique. Les comprimés sont pris non croqués avec du liquide, 1 heure avant ou 2 heures après les repas. Burgerstein Zinktabletten 15 mg n'est pas indiqué chez les enfants et les adolescents. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Burgerstein Zinktabletten 15 mg peut-il provoquer?
La prise de Burgerstein Zinktabletten 15 mg peut provoquer les effets secondaires suivants: Dans de rares cas, pyrosis, vomissements, diarrhée ou légères nausées. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il faire encore attention?
Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Burgerstein Zinktabletten 15 mg doit être conservé hors de la portée des enfants, dans un emballage bien fermé, au sec et à température ambiante (15-25°C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Burgerstein Zinktabletten 15 mg?
Un comprimé de Burgerstein Zinktabletten 15 mg contient 15 mg de zinc lié à des protéines.

Où obtenez-vous Burgerstein Zinktabletten 15 mg?
Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Emballages de 100 comprimés.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2009 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Numéro d'autorisation: 45432 (Swissmedic). Catégorie de vente: B.

Acides gras

Burgerstein EPA-Capsules 500 mg

Qu'est-ce que le Burgerstein EPA-Capsules 500 mg et quand doit-il être utilisé?
Burgerstein EPA-Capsules 500 mg contient un concentré d'huiles de poisson avec divers acides gras polyinsaturés essentiels (acides gras oméga-3) qui manquent largement dans notre alimentation. Le corps a besoin de ces acides gras pour synthétiser des substances analogues aux hormones (prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes). Un déficit en acides gras oméga-3 peut participer à l'apparition de certains troubles métaboliques des graisses. Burgerstein EPA-Capsules 500 mg est administré comme complément alimentaire diététique en cas de valeurs augmentées des graisses sanguines et afin de couvrir les besoins en acides gras insaturés.

Quand Burgerstein EPA-Capsules 500 mg ne doit-il pas être utilisé?
Burgerstein EPA-Capsules 500 mg ne doit pas être utilisé en cas de troubles de la digestion des graisses qui résultent de maladies de la vésicule biliaire ou du pancréas ou bien lors d'une hypersensibilité à l'un des principes actifs du produit.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Burgerstein EPA-Capsules 500 mg?
La prudence est de mise en cas de prise concomitante de produits destinées à fluidifier le sang (anticoagulants), car leur effet peut être renforcé par Burgerstein EPA-Capsules 500 mg. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique, ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein EPA-Capsules 500 mg peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Burgerstein EPA-Capsules 500 mg ne doit pas être pris durant la grossesse et la période d'allaitement.

Comment utiliser Burgerstein EPA-Capsules 500 mg?
Adultes et adolescents à partir de 14 ans:
A titre de complément alimentaire, prendre 3 fois par jour 1 capsule aux repas. Les capsules doivent être avalées dans un verre d'eau sans être croquées.
Burgerstein EPA-Capsules 500 mg n'est pas indiqué pour les adolescents et les enfants de moins de 14 ans. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Burgerstein EPA-Capsules 500 mg peut-il provoquer?
Rarement, on peut observer des réactions d'intolérance dans la région de l'estomac et de l'intestin, à type de diarrhée ou de douleurs abdominales. Les renvois d'huile de poisson et occasionnellement des nausées peuvent être au mieux évités si les huiles de poisson sont prises immédiatement avant les repas principaux. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?
Burgerstein EPA-Capsules 500 mg doit être conservé dans l'emballage bien fermé, à température ambiante (15-25°C) au sec et hors de portée des enfants. Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Burgerstein EPA-Capsules 500 mg?
Chaque capsule contient 500 mg d'huile de poisson avec 150 mg d'acides gras oméga-3 correspondant à 18% d'acide eicosapentaénoïque (EPA), 12% d'acide docosahexaénoïque (DHA), 5 mg de vitamine E et des adjuvants.

Où obtenez-vous Burgerstein EPA-Capsules 500 mg?
Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
Emballages de 60 et 180 capsules.

Numéro d'autorisation: 49417 (Swissmedic). Catégorie de vente: D.

Burgerstein EPO Nachtkerzenöl

Huile d'onagre EPO – médicament phytothérapeutique

Qu'est-ce que le Burgerstein EPO Nachtkerzenöl et quand doit-il être utilisé?
L'huile d'onagre est riche en acides gras polyinsaturés dits essentiels, car ils ne peuvent pas être fabriqués par le corps et doivent être fournis par l'alimentation. Ces acides gras sont les précurseurs de substances qui déploient de nombreuses actions dans l'organisme. Burgerstein EPO Nachtkerzenöl est utilisé comme complément alimentaire diététique comportant des acides gras insaturés d'importance vitale, notamment l'acide cis-linoléique et l'acide gamma-linolénique, en cas de graisses sanguines augmentées.

Quand Burgerstein EPO Nachtkerzenöl ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?
Lors de troubles de la digestion des graisses dus à une maladie du pancréas ou de la vésicule biliaire. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein EPO Nachtkerzenöl peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Burgerstein EPO Nachtkerzenöl?
Sauf prescription contraire, la posologie recommandée pour les adultes est de 2 capsules à prendre 3 fois par jour, avec un peu de liquide, avant les repas. L'utilisation et la sécurité de Burgerstein EPO Nachtkerzenöl n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Burgerstein EPO Nachtkerzenöl peut-il provoquer?
Aucun effet secondaire de Burgerstein EPO Nachtkerzenöl n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?
Burgerstein EPO Nachtkerzenöl ne contient pas de sucre et est par conséquent toléré par les diabétiques. Burgerstein EPO Nachtkerzenöl doit être conservé hors de la portée des enfants, dans l'emballage bien fermé, au sec et à température ambiante (15-25°C). Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Burgerstein EPO Nachtkerzenöl?
Chaque capsule contient 500 mg d'huile d'onagre comportant des acides gras polyinsaturés, dont au moins 9,0% (45 mg) sont constitués par l'acide gamma-linolénique. Cette préparation contient en outre des excipients.

Où obtenez-vous Burgerstein EPO Nachtkerzenöl? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie et droguerie, sans ordonnance médicale.
Emballages de 60 et 180 capsules.

Numéro d'autorisation: 48801 (Swissmedic). Catégorie de vente: D.

Produits divers

Burgerstein Lécithine

Médicament phytothérapeutique

Qu'est-ce que le Burgerstein Lécithine et quand doit-il être utilisé?
Burgerstein Lécithine est un produit naturel extrait à partir de l'huile de graines de soja contenant divers composants (phosphatides). Les phosphatides sont des composants naturels de nécessité vitale pour l'organisme qui en a besoin pour l'édification des parois cellulaires et pour le métabolisme énergétique. Burgerstein Lécithine est indiqué comme fortifiant au cours de la convalescence, d'états de faiblesse générale, de fatigabilité physique et intellectuelle.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?
Une alimentation déséquilibrée, une consommation abusive de sel et de graisses ainsi que le tabagisme peuvent altérer la capacité de performance. Pour cette raison, ils devraient être évités.

Quand Burgerstein Lécithine ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?
Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)!

Burgerstein Lécithine peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?
Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Burgerstein Lécithine?
Adultes: Prendre tous les jours 1 capsule 3 fois par jour aux repas. L'utilisation et la sécurité de Burgerstein Lécithine n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Burgerstein Lécithine peut-il provoquer?
On observe rarement des troubles gastriques et de la diarrhée au cours de la prise de Burgerstein Lécithine. L'absorption de lécithine peut être perturbée en cas d'affections biliaires ou de maladies pancréatiques. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?
Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp» sur le récipient. Le médicament doit être conservé hors de la portée des enfants, dans l'emballage bien fermé, à la température ambiante (15-25°C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Burgerstein Lécithine?
1 capsule contient 1200 mg de lécithine de soja. Cette préparation contient en outre des excipients.

Où obtenez-vous Burgerstein Lécithine? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie et en droguerie sans ordonnance médicale.
Emballages de 100 capsules.

Numéro d'autorisation: 50000 (Swissmedic). Catégorie de vente: D.

Préparations combinées

Burgerstein Anti-Ox/De-Tox

Indication
Allergies, affections rhumatismales inflammatoires, charges par des substances nocives (p.ex. taux de métaux lourds augmentés), maladies cardio-vasculaires, taches cutanées de sénilité.

Dosage
Prendre 1-2 capsules par jour.

Remarque
Conserver dans l'emballage bien fermé, au sec et à une température comprise entre 15-25°C.
Conserver hors de la portée des enfants

Composition
Chaque capsule contient:

bêta-carotène (4166 UI Vit. A)	2,5 mg
vitamine B1	10 mg
vitamine B2	10 mg
vitamine B6	25 mg
vitamine E	75 UI
vitamine C	200 mg
nicotinamide	15 mg
choline	25 mg
L-cystéine	75 mg
molybdène	75 µg
sélénium	50 µg
manganèse	2,5 mg
zinc	7,5 mg

Burgerstein Anti-Ox/De-Tox, 100 capsules, AR Nr. 11726

Burgerstein Multivitamin-Mineral ABC 25

Multivitamines et minéraux ABC 25

Indication
Etats d'épuisement psychique et physique, convalescence, allaitement, ménopause, malaises liés à la vieillesse.

Dosage
Prendre 1 comprimé par jour au repas.

Remarque
Vous devez renoncer à prendre cette préparation s'il existe un surapprovisionnement en vitamine A ou D, si vous prenez d'autres produits contenant de la vitamine A ou D ou bien si vous êtes traité/e par des rétinoïdes (p.ex. contre l'acné). Conserver dans l'emballage bien fermé, au sec et à une température comprise entre 15-25°C. Conserver hors de la portée des enfants.

Composition
Chaque comprimé contient:

caroténoïdes	3 mg
vitamine D3	200 UI
vitamine E	200 UI
vitamine K	30 µg
vitamine C	250 mg
vitamine B1	25 mg
vitamine B2	25 mg
vitamine B6	25 mg
vitamine B12	25 µg
niacinamide	25 mg
acide pantothénique	25 mg
acide para-aminobenzoïque	25 mg
biotine	25 µg
acide folique	200 µg
inositol	25 mg
choline	25 mg
bétaïne	25 mg
calcium	50 mg
magnésium	25 mg
fer	10 mg
manganèse	3 mg
zinc	10 mg
cuivre	1 mg
potassium	45 mg
iode	75 µg
chrome	25 µg
sélénium	25 µg

Burgerstein Multivitamin-Mineral ABC 25, 100 comprimés, AR Nr. 11993

Burgerstein Multivitamin-Mineral B75

Multivitamines et minéraux B75

Indication
Sollicitations psychiques et physiques intenses, états d'épuisement.

Dosage
Sauf avis contraire, prendre un comprimé par jour avec le repas de midi.

Remarque
Conserver dans l'emballage bien fermé, au sec et à une température comprise entre 15-25°C.
Conserver hors de la portée des enfants.

Composition
Chaque comprimé contient:

vitamine E	200 UI
vitamine C	250 mg
vitamine B1	75 mg
vitamine B2	75 mg
vitamine B6	75 mg
vitamine B12	30 µg
niacinamide	75 mg
acide pantothénique	75 mg
acide folique	400 µg
biotine	75 µg
choline	75 mg
inositol	75 mg
bêta-carotène	6 mg
vitamine D3	200 UI
acide para-aminobenzoïque	75 mg
calcium	35 mg
magnésium	15 mg
zinc	10 mg
fer	9 mg
manganèse	5 mg
potassium	10 mg
iode	150 µg
chrome	25 µg
sélénium	25 µg
bioflavonoïdes	25 mg
bétaïne	10 mg

Burgerstein Multivitamin-Mineral B75, 100 comprimés, AR Nr. 12037

Complexe de vitamines B

Indication
Sollicitations psychiques et physiques, états d'épuisement.

Dosage
Sauf avis contraire, avaler un comprimé par jour le matin ou à midi aux repas.

Remarque
Conserver dans l'emballage bien fermé, au sec et à une température comprise entre 15-25°C.
Conserver hors de la portée des enfants.

Composition
Chaque comprimé contient:

vitamine B1	50 mg
vitamine B2	50 mg
vitamine B6	50 mg
vitamine B12	25 µg
niacinamide	50 mg
acide folique	800 µg
acide pantothénique	100 mg
biotine	50 µg

Burgerstein Vitamin B-Komplex B50, 100 comprimés, AR Nr. 12038

Vitamines

Burgerstein Vitamin C 1000

Vitamine C 1000 – Avec la vitamine C naturelle, time release

Indication
Pour couvrir les besoins augmentés en vitamine C par exemple dans les situations suivantes: pendant et après des maladies infectieuses, traitements aux antibiotiques, grossesse, période d'allaitement, croissance, exposition chronique aux métaux lourds, stress oxydant, convalescence, blessures.

Dosage
Sauf avis contraire, avaler un comprimé par jour avec un peu de liquide.

Remarque
Conserver dans l'emballage bien fermé, au sec et à une température comprise entre 15-25°C. Conserver hors de la portée des enfants.

Composition
Chaque comprimé contient:
Vitamine C 1000 mg
(acide ascorbique, extrait de la poudre du fruit acerola et du cynorrhodon).



Burgerstein Vitamin C 1000, 100 comprimés, AR Nr. 12153

Notes

Notes

Notes

Notes

Burgerstein Vitamine